

(2)

IOANNIS VVIERI
MEDICARVM
OBSERVATIONVM
rararum Liber I.

De Scorbuto. De Quartana.
De Pestilentiali Angina, Pleuritide, &
Peripneumonia.
De Hydropis curatione.
De Curatione meatuum naturalium
clausorum, & quibusdam alijs.

Cum locuplete Rerum & uerborum
I N D I C E.



Cum gratia & privilegio Imp. ad
decennium.



BASILEAE, PER IOANNE M
Oporinum. 1567.

TO THE HONORABLE

THE SENATE OF THE UNITED STATES

IN SENATE, FEBRUARY 2, 1862.

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

IN RESPONSE TO A RESOLUTION

PASSED BY THE SENATE, JANUARY 15, 1862.

WASHINGTON:

GOVERNMENT PRINTING OFFICE,

1862.

PIETATIS, DOCTRINAE
ET EXISTIMATIONIS INSIGNIBVS
amplissimo uiro, Domino ANTONIO HOVAEO
Ecmundano, Abbati & Domino Echter-
nacensi, felicitatem in Christo
perpetuam.



V V M tam numerosa nostrorum tam recentium quàm ueterū flagitiorum frequentia. Antistes amplissime, nobis uariorum, eorundemq; grauium, nec saepe cognitorum, imò & nouorum morborum uelut parens fecundissima existat: & clementissimum Deum, patremq; omnium miserationum saepe numero irriter, ut inaudito pestium multiplici um genere, hoc potissimum exulceratissimo euo, non ita nos affligi, quàm paterna uirga ad instituti sui obedientiā reuocari cogiq; uelit: hoc profecto argumentis euidentissimis testatum, nemo facile negarit, nisi ueritatis religioni bellum praefractius indixisse, ab omnibus iurē censi malit. Siquidem enormium scelerum indies magis ac magis subnascentium monstra agnoscimus, morborum, quoque prodigiosorum hydram ex eo seminario enatam quotidie experimur nimis. Sed ea est benignissimi Patris nostri cœlestis clementia, ut licet nos aliquandiu eiusmodi castigationis acriori quadam moderatione in ordinem redigere studuerit: tamē ea demum media singulari diuina prouidentia studio, suis liberaliter suggerat, rationibus admodum multis, quibus ea pestes arceri & uinci queunt. Hanc eius clementiam beneficentiamq; non modo fateri oportet, sed & pro ea gratias agere perpetuas, in orationibus, uita respicientia, & charitatis operibus: quibus in proximum declarare debemus, si quid penes nos sit, quo singulari ratione is in calamitate constitutus leuari ualeat. Cuiuslibet hic esset, commissi sibi talenti pondus cum usura in fratris usum distribuere. Verū longē lateque transuersos hinc rapi mortalium animos, dum quilibet fixa uarias prurigine nimis affectus, & suipsius plus satis studiosus, id si.

*bi sepelire malis, ne sine ullo etiam rerum suarum detrimento alijs
 proffit, est quod ex animo doleamus: implorandusq; attenda mente
 misericordissimus Deus, ut nouis quibusdam amoris mutui facib.
 animos nostros inflammare, pro infinita sua bonitate dignetur. Ne
 uerò hic quod mearum est parium, negligenter pratermisisse, pro-
 ximoq; defuisse uidear, pro mea tenuitate non illibenter propone-
 re communicareq; uolui nostræ professionis argumentum, quo ater-
 ni Patris erga genus humanum intel'igatur uoluntas, affectus, stu-
 dium, & admirabile consilium in hominum conatibus iniquis ue-
 luti paterna uirga coercendis: dum morbos insolitos inauditosq;
 non solum immittit, sed & cõsilia maximè suggerit, commonstrat-
 que medicamēta, quorum ope ab acerbarum calamitatum uiolen-
 tia uindicari queamus. Est autem mearum quarundam observa-
 tionum, non illarum quidem uulgarium, sed rararum, nec cuius
 nostræ artis perito uel obuiarum uel cognitarum, quadam farrago.
 In hac primùm, quid in Scorbuto cognitu dignum obseruauim, in-
 genuè explico: quum hæc sædissima lues ortu quidem sit uetus, sed
 non nisi peculiaribus quibusdam regionibus familiaris: quæ tamē
 intra annos non multos suum uirus latius diffeminare cœperit, ut
 iam miserabiliter ijs in locis plerosq; torqueat, mutiletq; ubi ne no-
 men quidem, longè minus morbus fuerit auditus. Nec modo hunc,
 quid sit, eius causas, signa, & de eo prædictiones euidenter descri-
 bo: uerùm etiam quibus rationibus pestis hæc cum acerborum sym-
 ptomatum acerno superari extirpariq; possit, eadem opera mini-
 mè cælo. Inde, quæ in pertinaci febre Quartana, contra ueterum
 sententias consideranda ratus sum: item quæ in morbis nonnullis
 pestilentibus, nimirum Angina, Pleuritis, & Peripneumonia,
 præter aliorum tam recentium quàm antiquorum placita, ad rei-
 publice Christianæ usum maximè necessaria, ne in ijs tam cæca ra-
 tione in posterum consulatur, à me singulari industria sunt notata,
 ordine item subiungere non sum grauatus: eog. studio in alijs simi-
 libus casibus singula lucidiori mentis oculo contemplandi occasio-
 nem subministrasse uideor. Quædam præterea extrinsecus observa-
 ta, & potissimum in clausorum meatuum naturalium curatione,
 postremò annexui. Quæ autem mea diligentia, quæ rei ueritate,
 quo*

quo artis usu, qua etiam reipublice utilitate, intelligenti & a quo Lectori iudicium permitto.

Quaecumq; uerò sis, tua id Amplitudini, & commissio tibi cui societatig, nuncupare & consecrare multis de causis uolui. In primis autem, quòd beneuolentia me non uulgari, idq; tua sponte, complexus sis, ob editos meos de Præstigijs demonum libros: qui usque ad eò ad tuum fecere palatum, ut doctissimis tuis literis id testari, argumentumq; ad eorum auctiorem & ornamentum suppetitare non dedignatus fueris. Huc accedit, quòd nuper in Zuermondium tuum præter opinionem Embrica, ubi forè ad bibliopolium diuerteram, inciderim: quem euestigio emptum tanta auiditate & studio legi, ut noctis quietem ferè hoc nomine neglexerim. Usque ad eò enim placuit rei argumentum, pietatis affectus, orationis elegantia, & instructa in utraq; partem disceptatio, uel potius modesta collatio: ut quem antea amarem, colerem & reuererer, iam obseruantia ampliori dignum censerem: etsi quædam simulante in eo colloquio agi, ob quorundam morositatem, non obtusis naribus olfacere potuerim. Et licet mei ndiminis memoriam tam præstanti collatione indignam facile agnoscam (quippe qui tenuitatis propria conscius, me meo nouerim metiri pede) tamen à tua Ampl. pro humanitatis tue studio & candore id factum libenter patior. Ceterum quod ipsius rei institutum in illo Dialogo spectat, planè mihi uideris nunquam non satis laudandam Patrum consuetudinem, qua in fratrum societate non certare poculis, sed de uirtutum encomio celebrando, & uitiorum radice extirpanda, amice admodum & piè colloqui, mutuoq; admonere solent, non sine multa innocentis uite usura, in usum reuocare. Sic te Patrum uestigijs insistere, institutam bene religionis normam redintegrare, atq; uerè. Abbatem referre & agere, quilibet uel leui pietatis uera zelo ductus existimare poteit. Hanc itaq; nactus Spartam, adornare perge. Sic tuo exemplo alios in eiusdem functionis amplitudine constitutos, sed segiore, excitabis: ut partim pudore, partim etiam pio respiciendæ affectu, ad tue emendationis regulam se conformare studeant. Fælix interim illud sodalitiū, cui eiusmodi contigit antiſtes: felix grex, qui tam uigilantem sortitus est pa-

storem & dominum. Nec dubitare uolo, quin optimo gubernatori se attemperet commilitonū cohors, dicto audiens. Proinde fieri aliter nequit, quàm ut relatiua quadam hic existat reciprocatio & συμπάδεια. & quemadmodum dominum singularis doctrina, pietatis non obscura, & uita innocentis facib. prælucere constat: sic haud dubiè earundem radijs collustrata societatis commisse φερόμενα, iisdem insequetur uestigijs. Has itaq. Observationū mearū lucubrationes lucem uidere uolui, sub felicissimo tam eximij Antistitis auspicio: quem ut leue hoc grati animi significationis argumentum non auerfetur, plurimum oro. Interim Deum omnipotentem, uniuersi boni fontem unicum, precari nō desinam, ut te Praesul amplissime, suo spiritu porrò confirmet, atq. in te confertim adaugeat, quod pro sua bonitate feliciter cepit, ad nominis sui gloriam, & credita tibi societatis subditorumq. gregis salutem & incolumitatem.

Tua Ampl.

addictissimus

Ioannes Vuerus.

7
IOANNIS VVIERI MEDI-
CARVM OBSERVATIONVM LI-
ber Vnus.

DE SCORBUTO.



SCORBVTVS est, quando pro-*Scorbutus.*
pter splenis obstructionem impe-
ditur attractio humoris melanco-
lici, qui reliquo sanguini commi-
xtus, uniuersum corpus tabida
corruptione inficit: tum puniceis
litoris crura defœdans, ex crassiorum sui partium
decubitu: tum portione tenuiori sursum elata, tene-
ras gingiuas acri corrosione & putida carnis excre-
scentia uitians. Eiusmodi definitionū descriptio-
numq; libertatem Medicis usurpare licet, ad facilitio-
rem rei intelligentiā: quum alioquin curiosius hæc
in Logicorum scholis fore discutienda non ignorē.
Nomen uero fictum ex Danica, & maritimæ Ger-
manicæ lingua. Scorbuc enim ijs sonat ruptum uen-*Scorbuc.*
trem, quasi totus uenter & hypochondria, ut fit, pa-
tiantur: quomodo & Scormūt nostrates appellant, *Scormunt.*
quando inficiuntur gingiuę, quod ruptam buccam
uel os sonat: item Scorbein, quādo in cruribus mor-*Scorbein.*
bi symptomata uel signa apparent, quasi dicas, ru-
ptas tibias: Hollādis, à puniceis maculis blaufchuit *Blaufchuit.*
nuncupatur.

Stomacace & sceletyrbe Plinij est, cuius meminit *Stomacace.*
libro Natural. historię 25. cap. 3. ijs uerbis: Nec be- *Sceletyrbe.*
stiarum

stiarū solum ad nocendum scelera sunt, sed interim
aquarum quoq; & locorum. In Germania trans
Rhenū castris à Germanico Cæsare promotis, ma-
ritimo tractu fons erat aquæ dulcis solus, qua pota
intra biennium dentes deciderent, compagesq; in
genubus dissoluerentur. Stomacacen medicū uoca-
bant, & Sceletirben. Ei malo reperta auxilio est her-
ba, quæ uocatur Britannica, non neruis modo, & o-
ris malis salutaris: sed contra anginas quoq; & ser-
pentes. Folia habet oblonga, nigra: radicē nigram.
Succus eius exprimitur & ex radice. Frisij, quæ castra
erant, monstraueŕe illam. Apud hos, & finitimas
regiones maritimas, potissimum Septentrionē spe-
ctantes, sparsim illud malum hætenus sæuñt: proxi-
mis uero annis ad ditiones confines, ubi antea inau-
ditum, uel ex praua uictus ratione, siue contagione
proserpere cœpit, ut iam Germaniæ inferiori uni-
uersæ propemodum innotuerit: alioqui amplissi-
mo totius Germaniæ superioris regno adhuc inco-
gnitum, quemadmodum & Italiæ, Galliæ ac Hispa-
niæ. Si fortē in aliquo Asiæ uel Africæ loco lues
hæc sentiatur, is erit uel maritimus, uel alius ubi ra-
rus salubris aquæ usus, uel ubi uictus aut aer eius fo-
mitem suppeditat: proinde & morbus hic ei tractui
solummodo peculiaris, uelut maris quoq; Borealis
accolis: nullo modo autem cunctis mundi partibus,
ut reliquus morborum acruus, familiaris. Naba-
thæi siquidem in fœlici Arabia, & eo aduentantes
Romani, illam perpeſsi fuisse uidentur, Augusti Cæ-
saris

faris æuo. Huius etenim imperio quū in Arabiam exercitū Romanum traduxisset Aelius Gallus, eum in ipsa expeditione coactus est relinquere in Albo uico, maximo Nabathæorū emporio: ubi æstatem & hyemem transigere oportuit, ut reficerētur infirmi. Quandoquidem oris & crurum, cæterisq; eius loci uitij tentabatur exercitus, quorū illa circa os, hæc circa crura resolutionem quandam fuisse, ob aquas & fructus proueniētem, scribit Strabo lib. 16, circa finem: qui eodem tempore uixit. Peculiare uerò nomen eius pestis apud Arabes non comperio: cæterum medici uel Græci, qui apud Romanos tū potissimum medicinā faciebant: uel Latini, linguæ Græcæ periti, qui in illis bellis exercitus Romanos sectati fuere, ex symptomatibus quæ maximè tum in ore, tum in tibijs apparuerunt, nomina finxere Græca, ut morbus *σομακάλη*, ab oris uitio: *σκελετύρβη*, à tiliarū læsione infectioneq; appellaretur. Voces enim has, nec qui Germanicum Cæsarem comitabantur medici, à Phrysijs accepere, qui tunc temporis medicis, maximè doctis, & in linguarum peregrinarum usu tritis, caruisse uidentur, ut apta morbis nomina Græca formare nequiverint: si tamē forte quos habuerint, ij fuere patrij, & eruditionis exiguæ: ab Arabibus uel Nabathæis, easdem uoces identidem nō didicere medici Aeliū Gallum sectati.

Porro quæ Scelotyrbe ab authore Definitio-
num sub Galeni nomine describitur, nihil minus
est quàm Scorbutus noster: quū eam paralyssis spe-

*σκελετύρβη -
βιμονες -
se Scorbu-
tum.*

Quibus magni lienes, his gingiuas infici & putrere
asserit, illud unū symptoma est. Hinc subiūgit: Qui-
bus uero splenes magni, nec putrescūt gingiuę, neq;
sanguinis eruptio cōtingit, horū tibię ulcera sortiū-
tur maligna, atq; cicatrices hinc atras. Hic manifestē
apparet, Hippocratē in ea esse sentētia, q̄ eodē tem-
pore utrunq; illud symptoma in splene magno non
cōiungat: sed tibiārū ulcera tum primū subsequā-
tur, quādo humor ille melācholicus acris non ferat
sursum ad gingiuas, uel sanguinis eruptiōe minuat,
uerūm ad tibias fusidat, fœdē exulceret, et cicatrices
postea nigras relinquat. In Scorbuto autē, simul gin-
giuę putrescūt, foetentq; & tibiārū lituræ amplē li-
uescūt, quæ etiā q̄ rarissimē ad exulcerationē pue-
niūt. Hæ etiā præcedūt ulcera ea rara, maliciosaq; si
fortē tandē emergāt: nullaq; harū macularū magna-
rū, in hoc morbo semper ferē apparentiū, apud Hip-
pocratē mentio, sed solarū cicatricū post ulcera reli-
ctarū, quę cōmunes quoq; sunt cunctis exulceratio-
nibus ab humore melācholico natis. enim uero diffi-
culter admodū sanant: quare etiā in scyrrho splenis
cicatricem ea nō admittere, affirmat Paul. Aegineta
lib. 3. cap. 49. Ad Celsi sententiam, qui Latīna reddi-
dit ea Hippocratis uerba, lib. 2. cap. 7, idem dictū uo-
lo. Eadē ratiōe ad Cælij, & reliquorū eiusdē sentētię
ueterum authoritates respōsum sit. Scorbūtū ad-
hæc alium esse ab Ictericia nigra, & tertia Voluuli
specie, quā Hæmathitē uocat Hippocrates, & ego
lōgo medicinę usu obseruaui: et doctē in suo insigni
libello de magnis Hippocratis lienib. ostēdit excellē

tissimus medicus Balduinus Ronssicus, mihi necessitudine haud uulgari iunctus.

Ex recentioribus scriptoribus Scorbutum sic satis describit Olaus Magnus, natione Suecus, in sua Historia de gentib. Septentr. lib. 16. cap. 51. et simul-
tis in locis eum. alioqui figmentorū minimè puduerit. hæc ipsius. uerba: Est & morbus castrensis, qui uexat obfessos & inclusos: talis scilicet, ut membra carnosā, stupiditate quadam densata, & subcutaneotabo quasi cera liquefcens, digitorum impressioni cedant: dentesq; ueluti casuros stupescit, colores cutium. candidos reddit cæruleos, torporemq; inducit cum medicinarum capiendarum nausea, uocaturq; uulgari gentis lingua Scorbuk, Græcè cachexia, forsitan à subcutanea mollicie putrescente: quæ uidetur esu salforum ciborum, nec digestorum nasci, & frigida murorum exhalatione foueri. Sed uim tantam non habebit, ubi muri interius tabulis quorumcunq; lignorū sunt cooperti. Insuper si diutius grassetur iste morbus, absinthiaci potu continuato illum arcere: sicuti & calculi radices, per decoctionē ueteris ceruissæ cum butyro epotæ tollere solent.
Lib. item 9. cap. 38: Viribus, ait, primis annis, demū (milite stragibus cōtinuis diminuto) artibus, dolis. & insidijs obsidentiū surripiunt commeant, præsertim pecudes; quas secū abductas, in herbosis domorum tectis pascendas imponunt, ne defectu carniū recentiorū, morbum incurrant quibusuis ægritudinibus tristiorē, patria lingua Scorbuck nuncupatum:

cupatum: hoc est, faucium stomachum, diris cruciatibus & diuturno dolore tabefactum. Frigidi enim ac indigesti cibi auidius sumpti, morbum huiusmodi causare videntur, qualem medici cachexiam universalem appellant. Huius luis quoque obiter mentionit Albertus Crantz in sua Saxonia, item Euri-
cius Cordus in suo Botanologico.

CAVSSÆ.

Causa proxima erit humor crassus, crudus, frigidus, in uasis sanguinis contentus, siue is sit melancholicus, siue cum pituita mixtus. Causæ remotæ, sex res non naturales: aer corruptus; uictus prauus, putrisq; frequens in regionibus Septentrionalibus, maxime earum nauibus marinis, uelut caro suilla à coctione nonnunquam subolida, lardum fumo infarctum, exiccatumq; subinde rancidum, quãdoq; ab initio impurum grauisq; infectionis indicijs imbutum, plerunq; crudū etiam uoratum: item reliquæ carnes, & pisces saliti prius, deinde atromultoq; fumo transfusi & indurati, uel multo sale conseruati diu, similiter qui crassæ substantiæ & exucci sunt: caro uenatica & putida, uolucres aquaticæ, & quęcunq; aceto cõdita lōgo tēpore fuere, brassica, allia: panis biscoctus uetus, nōnunquā submu-
cidus: legumina, cereuisia crassa & feculenta, usus aquarum uitiosarum in dulcium penuria, unde sæuigignuntur morbi, testibus Hippocrate & Plinio: i-
tem ieiunia, cum exiguo succi mali cibo: adhuc uigi-
liæ, labores intempestiui, immodiciq; affectus ani-
mi.

mi, cogitationes graues assiduæ: præcedentes quæque febres, & uacuationum debitarum uel consuetarum intermissio siue suppressio, uti hæmorrhoidum, menstruorum, & similium.

SIGNA.

Signa in morbi principio: Corporis totius grauitas, spontanea crassitudo, qualiscunq; præcordiorum angustia, crurum imbecillitas, leuisq; rigor, cum dolore exiguo: gingiuarum pruriginosa rubedo à naturali mutata, ac dolor: faciei color ex pallido in fuscum uergens. In incremento, gingiuarum lusus sanguinisq; tumor, & putredo cum oris foetore, quarum aliquando etiam caro ad dentium radices consumitur, utrobique dentes uacillant: crurum adhæclituræ conspersi leuiter sanguinis faciem ostendentes quandoq; & quales morfu pulices imprimere solent, maiores tamen, quæ etiam in femoribus, & toto corpore sparsim aliquando apparerent, ex minus crasso sanguine procreantur: plerumque etiam maculae amplæ, plumbeæ, liuidæ, purpureæ, nigris uiolis obscuriores, ex fece corrupti sanguinis eò decumbente genitæ: quare raro admodum in alijs locis quàm cruribus emergunt. Quodcumque uero hæc uidentur, certissime scorbutum adesse denunciant, etiam si alia signa adhuc delitescant. In faucibus item aliquando is liuor apparet in ijs, quibus uniuersum corpus hac putrilagine ita permaduit, ut fere mortis periculum haud longè absit. In grauescente morbo, neruorum in cruribus rigor, ambulandi impotentia, neruorum item contractio, anhelitus difficultas, maxime

ximè ubi æger mouetur, aut erigitur, aut sedet: tum
 quoq; ferè uel omnino linquitur quandoq; animo,
 decumbens autem respirat liberius, reficiturq;. Qui
 dam appetunt cibum frequenter, quibusdam eden-
 di auiditas languet. Motus aggrauatius in multis
 quarto quintoq; die, in plerisq; tertio; in paucis, sin-
 gulis diebus, sine manifesta tamen febre, obserua-
 tur. Aliquos interim quãdoq; simul febrere, non est
 dubium. Nonnulli enim hac lue correpti, febre len-
 ta erratica afficiuntur. Aliquando etiam febres præ-
 cesserunt ardentes, malignę, duplices tertianę: & u-
 bi in ipso Scorbutto nondum post eas febres perfe-
 ctè curato, febris quartana ualde maligna subsequere-
 tur, uidi: & in ipsa quartanę declinatione rursus
 apparuit Scorbutus, sano tandem consilio uictus.
 Sic et febres non adeo per crissim terminari sæpenu-
 mero uidentur, quàm nouos ex labefactatis uisceri-
 bus, atrophia, et multa sanguinis corruptione putri-
 laginẽq; producere morbos, prioribus non raro pe-
 iores. Quibusdam alius astrictior, alijs fluxilior.
 Liuior ille crurum quandoq; integras tibias inferio-
 res circumquaq; usq; ad pedes, cum tumore ita obli-
 det, ut elephantiasis notam esse quis iudicaret: rur-
 sus aliorum crura sic attenuantur, ut ossa uideatur te-
 gere cutis sola, plerumq; cum calore multo, nonnun-
 quam absq; eo. Quorundam etiam maculę in squā-
 mulas resoluuntur, quemadmodum in crisypellate
 uideri ferè assolet: aliorum leues, æquales, nonnun-
 quam splendicantes permanent cum leui uestigio
 ad digiti.

ad digiti impressionem. Plerunq; etiam, licet raro admodum, apparet uaricosa uenarum plenitudo, et sub lingua tota uenæ minutissimæ, uaricibus perquam similes: identidem & in inferiori labio conspiciuntur. Pulsus hic, ut in quartana febre, uarius, exilis, durus, frequens, debilis, pro temporis morbi uarietate. Urina rubicunda, turbida, crassa, sæculenta admodum uini rubri recentis: quemadmodū & feruente quartana, potissimum à sudore, solet apparere: est & grauis odoris.

PROGNOSTICA.

Scorbutus in iisdem familijs aliquando frequēs, partim quòd eodem uictu sint usi egroti, quare contagione putatur serpere: partim quòd contagio lædat, ubi in oris & gingiuarum uitio, ex iisdem poculis bibunt, uel assidua contrectatione uitiatos spiritus admittunt. Quandoq; est à parentibus hæreditarius.

Febres aliquando in hunc morbum terminantur. Hunc etiam plerunq; tabes comitatur: subinde hydrops, quandoq; & dysenteria: atrophia uerò prope modum semper.

Ulceræ in tibijs si nonnunquam exoriantur, quod raro tamen fit, cicatricē difficulter admittunt: quippe foetida admodum, maligna, & aliquando gangrenosa: ita plerunq; corrupta, ut immissum ferrū non sentiant.

Habent nonnulli in hoc morbo illæsas gingiuas,
sed

sed defocdata crura: qui uel ex ore, uel naribus sanguinem reijciunt.

Morientibus ex hoc malo plerisq; delitescunt maculae, alijs à morte efflorescunt uberrimè.

VICTVS.

Victus sit concoctu facilis, & boni succi, moderatè calefaciens, tenuis, incidens etiam subinde, atq; attenuans, abstergensq; cui leuiter astringentia accedant quandoq;. Conuenit polenta nostra hordeacea, imò & auenacea, uel hordeum excorticatum, cocta in iusculo aut aqua, deinde cum uino per setaceū redacta. Passulae Corinthiacae item coquantur in iure aliquo idoneo, uel etiam aqua & uino, atq; similiter per setaceum transmittantur: potest & oui uitelus subinde commisceri. Eadem quoq; passulae manduntur, si nimia siti aut oris siccitate laboret aeger. Profunt & amygdala, cum colatura decoctorum furfurum triticeorum apparatus, quibus amarorum pars aliqua fuerit mixta. Aromata in cibo, pro flaccidi corporis & morbi exigentia, quandoq; miscenda: ut cinamomum, macis, nux myristica, & zinziber. Omphacij usus hic nō inutilis. Condimenti loco assumantur & interdum cappares, cum uuis passis Corinthiacis ex oxysaccharo, uel oxymelite longo: atterantur uero dentibus prius minutissimè, quam deglutiantur. Potus sit, cereuisia bona, optimè defecata, maximè absinthites, uti & uinum eadem herba cōfectum: aut si quis chamædryte afficiatur, erit & hoc utile multum. Aqua etiam lactis

c haud

haud temerè quis utetur. Lac item caprinum: uel, in eius defectu, uaccinum recens, in quo decocta fuere sisymbrium cardamine, uel nasturtium hortense cum folijs latioribus, hyemale uocant: uel cochlearia, non sine successu pleriq; usurpant, potissimum qui lacti assueuere, eoq; afficiuntur, uel qui id innoxie patiuntur. In cubiculo uersentur sicco, calido, mundo & lucido: tristiores animi affectus excludant.

CVRATIO.

Curatio à sanguinis missione inchoanda erit in initio, si eius fuerit plenitudo, uires, ætas, & reliqua cõsenferint. Copiosam autem extractionem hic dissuasferim. Per hæmorrhoides si legitime uacuetur, commodum erit. Si peculiari modo affectus cõperiatur splen, lienaris uel media in sinistro brachio aperiatur: sin uero hepar magis, uel æque grauatur, corpusq; sanguine redundare deprehendatur, tum dextri brachij pertudatur iecoraria, uel basilica, aut media. Quum autem raro aduocetur medicus, nisi altas malum egerit radices, inualueritq; & lituris in tibijs se morbus prodiderit, à sectione ueng abstinendum consuluerim.

Hinc leuiter corpus uacuetur cum folijs senæ Alexandrinæ, quam uocant, expurgatis ad 3 s. uel 3 iij, uel minus, si epithymi tantundem adiunxeris, cum paucis passulis Corinthiacis, sem. foeniculi & zinziberis an. 3 s. quæ simul uespertina hora in feri lactis quantitate sufficient leuiter efferveant, & maceren-

maceretur noctu: deinde manè post feruorem unicum forti exprefione coletur ferum, quod propinetur. Potest & ꝑ s. fequentis pulueris eodem modo infundi, colaturâq; exprefsa exhiberi:

℞ Fol. fenæ Alexand. expurg. ꝑ i.

epithymi

tartari albi, an. ꝑ s.

cinamomi

gariophyll.

galangæ

fem. anifi, an. ꝑ i.

diagredi ꝑ i. s. fiat pul.

Conferunt & pilulæ de fumaria ac diasene. Pilulas etiam ex lapide lazuli & armeno etfi quidam exhibeant, mihi tamen displicent. Confectionem hamech qui offerre quoque uolent, quantitatis ut fingularem habeant rationem necesse est, quum uehementes expurgationes innoxie hic morbus non ferat, ubi tam facile cor afficitur, læditurq;.

Purgato fuauiter corpore, fingulis diebus bis, hora nimirum matutina, qua etiam in plerisque sudor expectatur, & quarta pomeridiana, affumetur ꝑ iiii succi exprefsi ex herbis fequētib; admifcebiturq; facchari puri quantum uoles, & canellæ parum.

℞ Cochleariæ, lifymbrij cardamines, nafturtij hysmalis dicti, an. partes æquales: bacabundę partē mediā, quantitate obferuata unius prædictę herbę: hę uirides in mortario lapideo cum piftillo ligneo contundent, exprimunturq;. Cæterum eę potiffimum in

in hoc morbo extirpando singularem sunt sortitæ ex ratione prærogatiuâ, quum primæ tres incidunt, extenuent, & per urinas expurgent, quarta aliarum uires contemperet. propterea etiam pro corporis, morbi & caloris ratione, augeri uel minui potest. Contusæ item illæ in lacte caprino recēti, uel in eius penuria, uaccino decoquuntur: & à forti expressione simili modo potus propinatur. Recentem eum quotidie apparari consultius est. Foelicem quoque successum expertus sum, si quando in lactis ferro illæ plantæ decoquerentur: succorum tamen exhibitio præstat, at ex docti exercitatioq; medici arbitrio hæc mutari queunt. Vbi & cum uino rubello coquerentur non temerè, memini. Liquoris uero non magna superfundenda quantitas, quod succulentæ sint herbæ. quare hæc solum eius admixtione contegentur ad coctionem: aliàs cum ijs liquoribus etiam per cribrum setaceum ualida expressione trahi solent contusæ crudæ. Absinthium uulgare admixtum, confert plurimum: utiliterq; adiunxi sepe numero fumariam, & chamædrym. Nummularia quandoq; ob laxa uiscera & dissolutas compages, miscetur. Si alijs deinde multa aliarum materialium farrago placuerit, quemadmodū myrabalanorum, maxime Indorum, corticum radicum capparum, fraxini, cuscutæ, asari, thymi, epithymi, adiathi, matricariæ, chelidonij, betonicæ, hysopi, agrimonix, scabiosæ, teucrij, phyllitidis, cetorach, tamarices, acetosæ, radicum ualerianæ, bistortæ, enulæ, polypodij.

podij, lapati acuti, foeniculi, petroselini, pimpinellę, cicorij, borraginis, buglossę, rhapontici, aristologię rotundę, glycyrrhizę, passularum, senę Alexandri nę: florum genistę, sambuci: seminum anisi, foeniculi, uiticis, semin. frigid. & id genus reliquorum, per me licet: ex paucarum tamen plantarum legitimo usu curationem consequutus sum non raro felicem.

Hoc item remedio infinitos esse curatos intelligo: *℞.* Comę absinthij vulgaris sicci, granorum iuniperi contusorum an. m. i. lactis caprini ℥b iij. coquantur ad tertię partis consumptionem, exprimendo colentur. deinde admisce croci in puluerem redacti *ʒ.* i. denuo ebulliant feruore uno aut altero, secundo colentur. Decocti huius datur haustus tepidus ter in die, hora matutina, ac tertia pomeridiana, & quando cubitum itur.

Mulierem noui in Scorbuti curatione celebrem, quę corpore uacuato hanc propinabat potionem: *℞.* Bacabundę, sisymbrij cardamines an. m. iij uel iij. contusis herbis admisce seminis erucę, rad. irios hortensis nostri vulgaris recētis an. *ʒ.* s. zinziberis *ʒ* ij, piperis longi *ʒ.* i. simul per colum traiciantur cum uini rubri ℥b ij. Ex hoc potu commoto haustum singulis diebus matutina hora calide offerebat, deinde ægro diligenter cōfecto eliciebat sudorem, nouem in ea curationis ratione impendens dies.

In comitatu Marcensi bacabundam, sisymbrium cardamine & aloen cōtusa, & cum lacte colata, propinant nobiles quędam matronę. Tenello in fan

ti cum cum successu aliquoties apozema hoc exhibuit Comitissa quædā: ꝛ Rhabarbari, cētaurij minoris, rhapontici uulgo dicti, an. ʒ s. sem. anisi, liquirit. an. ʒ ij, in puluerem redacta trañciantur cum expresso liquore manipuli florū damascenorū, quos uocant, in aqua decoctorum: hinc cum sacchari quātitate sufficēti fiat syrupus longus, unde coclear mane & uesperibibit.

Ingratam, & ferè abominabilem potionē in Phrysia Orientali, uelut certissimā in Scorbuti curatione habitam, hic subiūgere uolui, ut excrēmētis quæque suam inesse uim naturalem quilibet uideat: quæ tamē in usum non admittimus, quòd alia magis grata, neque usque adeo abominabilia, certiori ratione usurpari queāt, iucundiorq; curationis modus obseruetur. ꝛ Vini Rhenēsis mensurā sex quartarū (singulæ quartæ pendēt lb̄ iiij medicinales) radicū raphani maioris boni et recētis in mortario lapideo diligēter contus. ʒ iij, quæ cum parte uini dicti in olla seorsum mixta macerentur per horam integrā: liquor fortiter expressus per linum, cum sex uini dicti quartis cōmisceatur: deinde in eiusdem uini portionem aliam immittatur separatim stercoris taurini & anserini par quantitas trium magnarū nucum, itidemq; per horam relinquatur: post ualidam inde expressiōē uino primò affundatur. hinc ꝛ Nucū myristicarum, gariophyll. an. ʒ ij, contusæ seorsum, linoq; illigatę, in dicto uino suspendantur, atque eo modo horis uigintiquatuor potus consistat. Inde quotiescun-

quotiescunque sitit æger, largè bibit; nec aliam usurpat potionem, donec integram fuerit consequutus sanitatē. Potus autem hic apparari secundo poterit, si requirat necessitas. Interea cauētur salita ualde, secalinusq; panis. Quum Phrysia taurorum & anserum sit feracissima, ex paratu facilibus ibi concinnantur eiusmodi medicamenta. Tantam autē uim caloricā stercorei anserino inesse, ut in quā incidit gramina, urat; & hinc cum liquore conuenienti transfusum incidere, menses, secundinā & urinas potenter mouere, constat: nec dubium est, taurinū sterces identidem huc nonnihil facere.

Vacuationes priores semel atq; iterum tota curatione recitari queunt. Inde diebus alijs offerat matutina hora cochleariæ cōserua, uel etiam cōserua chamedrytes, seorsum uel mixtæ: quibus accedant radices buglossę uel borraginis conditę, uelut & enulæ.

Porro notandum, omnes ferè plantas acres, quibus inciditur attenuatur que materia morbifica, ad huius mali profligationem iuuare: ne quis sibi persuadeat, à tota substantia uel forma occulta solum herbas tanto pōre prædicatas, nobisq; hic familiares, ut efficacissimas, puta sylibrium, cochleariam & bacabundā, istum profligare morbum. cuiusmodi sunt, præter enumerata paulo antè, draco, scordium, semperuiuum minus, herbæ omnes spleneticæ, radices aperitiuæ, semina calida, bacca lauri, iuniperi, atque id genus substantiæ reliquæ.

Hypochondria illinantur, Sinistrum hac uel simili

li mixtione: *℞.* Olei de capparibus \mathfrak{z} i. unguenti de brionia contra splenem \mathfrak{z} s. misce. Dextrum, oleo absinthite: quibus, si postulet necessitas, primarum nostrarum herbarum succus incoquatur.

Gingiuæ laxæ & putridæ interim colluantur cum decocto foliorum & corticum oxyacanthæ uulgaris, cochleariæ, sisymbrij cardamines, nasturtij hyemalis, & rosarum rubrarum immaturarū, in aqua ferrata præparato, in cuius colatura expressa aluminis paucillum fuerit dissolutū. Saporis & abstersionis ratione admisceatur mel crudum, uel roseum: siue, ut conseruentur confirmenturq; magis gingiuæ, imò & feruor restinguatur, diamorōn. Valēt huc quoq; oleastri folia, cum stillaticio plantaginis succo expressa: item pruni syluestris cortices.

Collutio quoq; alia hoc conficitur modo. *℞.* Aquæ \mathfrak{lb} . i. salis, aluminis, an. \mathfrak{z} ij. buliant simul. Itē: *℞.* Malicorij, sumach, balaustiorum, an. \mathfrak{z} s. passularum \mathfrak{z} i. cum aquæ fluuiialis \mathfrak{lb} iij. ad medietatis absumptionem coquātur: traiectoq; per colum liquori admisce mellis rosacei \mathfrak{z} ij, aluminis \mathfrak{z} ij. Confri cantur & gingiuæ sanguinolentæ & flaccidæ, sale usto, cui puluis balaustiorum fuerit immixtus: uel cineribus sarmentorum, cum testis ostreorum aut myrtularū ustis: interim illa sanguinis sanies quoq; exugitur, expuiturq;. Inde etiā os colluitur decocto radicū bistortæ, quæ uirtute britannicæ simili pollet: hinc & succus exprimitur, ut etiā ex dicto nostro nasturtio, & cum diamori parte dupla misce
tur,

tur, quo gingiuæ illinuntur. Vel, & Succibistor-
tæ, mellis rosacei an. ℥ iij, ad succi consumptionem
coquantur: inde aluminis usti ℥ i. admisce, hoc lini-
mento utere. Quemadmodum & hac confectioe:
& Bistortę ℥ s. salis 3. i. cum diamoro, ad conditi cō-
sistētiam misceatur: sic & alumine ac pyrethro cum
melle crudo mixtis, quibus ex saluæ & olibani pul-
uisculo parum indi potest. Cuius supra memini,
muliercula, collutionem parabat ex hylopo, ambro-
siana, betonica, & radicibus enulę, aquæ incoctis: in
colaturæ expressæ ℔ ij, dissoluebat aluminis ℥ s. &
simul cū melle sinebat effervesce, despumabatq;.

Phrysij aliam cōficiunt, ex aceti cereuisiarij ℔ ij.
boli armeni ℥ s. aluminis ℥ ij, mellis ℥ iij. simul buli-
unt. Saxones pleriq; sabinam adiungunt.

Si gingiuarum putredinosus tumor nimis luxu-
riet, forficula nonnihil auferatur, & unguento Ægy-
ptiaco uel alumine usto cum rosaceo melle mixto
cōsumatur: aut etiam uitrioli oleo coerceatur. Est
& hæc aqua in earum putredine eximia, quomodo
etiam in malignis ulceribus, si spongiola eo liquore
imbuta cōfricentur gingiuę. & Arsenici sublimati
3 ij, aluminis usti ℥ ij s. in puluerē contusa simul bu-
liāt in aquæ plātaginis ℔ i. ad horā, in uase duplici.

¶ Lituræ in eruribus, fouētur decocto baccarum
iuniperi leuiter contusarum, sisymbrij cardamines
utriusq; nasturtij hyemalis, cocleariæ: quibus, si uo-
les, adde flores camomillæ, artemisiā, melissā, ab-
sinthium, rosmarinum, maioranam, thymum, hyso-
d pum,

pum, & similes herbas, quæ aquæ incoquantur. Si & spōgias ex eo calido expresseris, inferioribus, que tibiærum partibus utrinq; applicueris, maculas sub cute obscuras & adhuc delitescentes manifestè elicies, ut efflorescant, & Scorbuti signa luceant.

Linimento hoc inungentur quoque. & Butyri maialis ℥ ij. s. baccarū iuniperi cōtularū ℥ vi. uini puri ℥ ij. coque in fictili. ad uini cōsumptionē. expressione uehementi colato: ungantur crura mane & uesperis. Vel fiat illinitio, butyrositate collecta ex lacte, in quo decocta fuerint sisymbrium cardamine, nasturtium hyemale, bacabunda, absinthium, et baccæ iuniperi contusæ. Applicantur & panni, ea pinguedine imbuti. Habenda etiam ratio caloris, ut insigniter calefacientes plantæ tum minuantur, bacabunda augeatur, & in lacte ebutyrato appareatur decoctio. Coagulum lactis ebutyrati per se quoque apponitur, uel lacebutyratum recenter concretum. In tumoribus durioribus admouetur cataplasma ex lacte, cui consolida maior fuerit incōcta, absinthium, siue etiam chelidoniū maius & minus, radices brionix, medulla panis, farina fabarum, uel hordeacea quoq; uel lupinorum, pro affectæ partis constitutione, aut calore.

Nerui, ligamenta & tendones, si huius materiæ grauis copiam imbibierint, rigidioraq; & ad motum inepta fuerint reddita, post fotum, uel etiā absque eo, inunguntur adipe anserino, uel anantino, uel taxi pinguedine, aut simili.

Si

Si tibiæ exulcerentur, pro ulceris conditione mutanda, quæ adhiberi debent: pro absterfione autem, & mundificatione, paretur linimentum ex cochleariæ, apij & absinthij succo, ac mellis quantitate debita, coctis ad consistentiam: cui, si putredinis magnitudo postulauerit, siue pulueris aristologiæ rotundæ, uel aluminis usti, uel præcipitati momētum admisceatur. Conferet quoque emplastrum diacalciteos, siue diapalma, quod nō nihil etiam cum oleo rosaceo dissolui potest: item ad cicatricem citius inducendam, emplastrum de minio, uel unguentum de tutia, uel consine, postea applicetur.

APPENDIX.

¶ Quum inter morbi huius causas non minima exultat aquæ uitium: quæ hinc corpori humano accessantur incommoda, ad pleniorē nostri instituti explicationē, hic ex Hippocrate subiungere uolui, Lib. de Aere aquis & locis, ubi ita scribit: Hyeme uerò glaciata, frigida, ac turbata præ niue & glacie, ut pituitosissimæ & mucosissimæ existant. Bibentibus autem splenes sunt magni ac pleni, & uentres duri, tenues ac calidi: humeri uerò ac clauiculæ & facies attenuata. In splenem enim carnes colliquantur, quapropter graciles existunt. Edaces autem esse tales, ac siticulosos, par est: uentresque tum supernos, tum infernos, calidissimos habere, ut etiam fortioribus medicamentis opus habeant: atque hic morbus ipsis & æstate & hyeme familiaris est. Adhæc etiam hydropes plurimæ ac letalissimæ fiunt. Æsta-

te enim dysentericę multę acalui profluuia incidunt, & febres quartanę diuturnę. Hi autem morbi prolongati tales naturas ad hydropas deducunt, ac occidunt. Et hi quidem morbi iplis æstate fiunt: hyeme uero iunioribus quidem peripneumonię, & infantię morbi: senioribus uero febres ardentes, propter uentris duritiem: mulieribus autem tumores oboriuntur, & pituita alba, & uix in uentre concipiunt, ac difficulter pariunt: & fœtus magnos ac tumidos, deinde ex alimentis tabescentes ac deprauati fiunt. Expurgatio commoda post partum mulieribus non contingit. Pueris uero hernię accidunt, & uiris uarices & ulcera in tibijs. Quare fieri non potest ut tales naturę sint longęuę, sed ante temporis aduentum senescunt. Præterea fœminę se in utero habere putant: & ubi partus tempus adest, uentris moles illa ac plenitudo euanescit: hoc autem contingit ex aqua, quum uteri ex aqua concepta laborant. Atq; has quidem aquas ad omnem rem improbas esse sentio. Intelligit autem de palustribus, stabilibus & lacustribus: nam earum & paulo ante meminerat.

Adhęc, quod in lacte plantas coquant, expressumq; liquorem successu sausto hauriant ægroti, id feri magis ratione quàm totius lactis euenire sentio, dum in colatura butyrositas uel lactis coagulum in cribro setaceo uel panno lineo, per quę transmittitur liquor, adhærescit, permanetq;: & si quippiam simul transfluit, reliqui succi acrimoniam cõtemperat,

rat, ob qualitatem suam calidam & pinguem. Serum autem, sanguinis sero, id est lotio facultatibus respo- dens, & propterea acre & calidum, tenuiumque par- tium, abstergit, aperit, urinas mouet, atque ad huius- luis profligationem cumprimis utile, ex priscorum etiam testimonio. Siquidem Actius Amidenus ex Galeno, lib. 2. cap. 94. sic scribit: Efficaciori sero uti- tur aliquis ad corpora & morbos, quæ ualidioribus præsi- dijs indiguerint, præsertim ad diuturna exan- themata, liuentesque uaros, ad omnesque humorum deprauationes in cutim tendentes, ut lepram & consi- milia, ad antiqua ferinaque ulcera, ad capitis achores, & huiusmodi item ad oculos assidue fluentes, ad pal- pebrarum scabiem, ad faciei maculas, immo & ad diu- turnas febrium periodos, & ad hos qui ab aduersa ua- letudine in hydropem pergunt. Prætulit Mesues serum ex nigrarum caprarum lacte elicatum, deinde ex ouillo, sic inquit: Aqua lactis macerationis ma- teria est, et per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, quæ sit ex lacte nigrarum caprarum, in- laudatis pascuis uictitantium, recenterque foetarum; Excalfacit hæc, atque siccet ordine primo comple- to, & usque ad secundum. Quinetiam attenuat, ab- luit, abstergit, & nitrosa, quæ referta est, facultate al- uum absque aliqua mordacitate leniter subducit. Bi- lem tum flauam tum atram ab exustis humoribus genitam deijcit: quo fit, ut mirifice conferat mania- cis & melancholicis. Præstat item ad uiscerum infar- ctus, & morbis inde prouenientibus opitulatur, ni-

mirum aqua intercute laborantibus, felle suffusis, & lienosis. Datur utiliter febrientibus ex bile, & uiscerum ac uasorum obstructionibus. Competit etiamnum uitijs in cute à bile & perustis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, uertiliginibus, alphis, pforis, leprisq; admodum conuenit.


¶ Ne præterea remoram Lectori iniiciat plantarum nostrarum non ita uulgarium ignoratio, paucis meam explicabo sententiam, potissimum quum hic mirè nostrorum hominum iudicia uariant. Præcipua autem celebriorq; est Cochlearia, quæ ternas perspicuè ostendit formas, pro ætatis diuersitate. Primo enim ortu foliola edit ophioglossò uel lingue serpentinae simillima, quæ confertim ab ipsa radice cum pediculis emergunt: deinde post adolescentiam carnosiora euadunt, asaroq; & magnitudine ferè & figura respondent, nisi quod circuitus notetur obtusioribus angulis, ut plurimum septenis uel nouenis, potissimum etiam hyberno tempore: foliorum item minor portio plana, frequentior uerò conspiciatur incurua ad cochlearis analogiã, ex qua & etymologia ratio tam apud Germanos quam Latinos profuxit, & Cotyledon dici merito posset. Tandem altero ætatis anno folia illa hederacea, uel asaro cõformia, striant, gracilescuntq; paulatim, eo magis, quo altius à radice ad umbellam conscendunt, angulis interrim quoque se manifestius prodeuntibus: idq; mensibus Martio, Aprili & Maio, quibus flores luxuriant albi; in quorum locum deinceps mense lunio

nio succedit semen uberrimum, quod maturum in exiguis capsulis apparet obscure subrubrū, exiguū & planum. Radix huic est tenuis, albicans, recta, nō longa. Gustu herba deprehenditur calida in secundo gradu completo, aut potius tertio, sisymbrijque cardamines acrimoniā attingit. Apud nos planta est domestica: apud Hollandos, Phrysijs & cōfines ditiones maritimas sylvestris. Et quia à nullo planta hæc depingitur auctore, præterquā eruditissimo Dodonæo, qui tamen in eius delineatione multum deliquit: uolui ego primus posteritati exhibere genuinam effigiem.

Cochleariæ

IOAN. VVIERI
Cochleariæ integræ forma.



Adolescentia & hyberna
cochleariæ folia.

Contendunt *Cochleariā*
 pleriq; hanc esse *non esse Telephium.*
 Telephiū, quod
 portulacæ simi-
 lia folia habere
 iudicet: id quod
 à me negatur. li-
 cet quoque ade-
 ius similitudinē
 folia habeat, ne-
 quit tamen uni-
 ca hæc conditio
 nobis inde crea-
 re telephiū: a-
 lioqui cepea, cri-
 thinū, tribulus
 terrestris, tithy-
 mallus, heliosco-
 pius etiam forēt
 telephiū, quum
 folia fortiantur
 portulacæ, hoc
 est crassā, lenta,
 carnosā. At plu-

res sunt notę repugnantes. Primum enim, Telephiū
 habet folia cęrulea, id est obscure nigricantia: ut plū

c bago

bago Plinij, branca ursina, &c. cochlearia saturati est uiroris. Secundo, illius folia sunt plana, æqualia: huius ut plurimum ad cochlearis formam incurua, cum exiguis angulis. Tercio, cauliculi telephij altius surgunt, sumq; referti folijs plurimis: cochlearie pediculi à radice assurgunt plurimi, cum folijs singulis in unoquoq; pediculo. Quarto, nec caulem hæc habet portulacæ similẽ, hoc est pinguem & rotundum: sed pediculos solummodo introrsum angulosos, extrorsum rotundos. Quinto, illius flos quandoq; est albus, nonnunquam luteus: huius semper albus. Sexto, loci ratione diuersitas contingit. Telephium enim in cultis, & maximè inter uites nascitur: cochlearia uero in Phrysiæ & Hollandiæ pratis & aggeribus mari finitimis, non uinetis. Septimo, facultatis gradu differentia liquet, quandoquidem illud exiccandi & detergendi uirtute præditum esse dicit Galenus, quemadmodũ & Dioscorides, quũ utiligines curare scribat: sed non esse calidum insigniter, nisi in primo gradu. at cochlearia eundẽ occupat gradum, quem sisymbrium cardamine: acrimoniam enim insignem præbet gustui. Telephium itaq; & Cochleariam discrepare, asserendum.

Cochlearia *et Britan-* *nica di-* *uerfas esse* *plantas.* *lam uero, neq; esse Cochleariam eandem cum Plinij Britannica plantã, ut nonnullis placet, hinc præter cætera demonstratur, quod non sit altera à Dioscoridis Britannica, quæ syluestris lapathi sortitur folia: sed nigriora, pilosiora, & gustu astringentia: cochlearia autem rotunda, uiridiora, asaro similia, læ-
uia.*

uia, minimè hirsuta, ut nec ullo modo astringentia, urinam etenim promouet: proinde etiam anginae nullatenus conducit, uelut illa, ut Plinius uult. Britannica item habet caulem: cochlearia uerò multos pediculos cum singulis folijs ab una radice, quæ etiam hic ad spithami longitudinem tendit: illius, breuis est.

Sisymbrium Cardamine siue nasturtium aquaticum minus, nasturtium aquaticum maius, & nasturtium hortenfe hyemale.

Sisymbrium quibusdam Cardamina dictum, nasturtium est aquaticum minus, exiguis primo exortu folijs rotundis, quæ adolefcendo paulatim gracilesunt, prolonganturq; ramulis numerosis, in cacumine tantū comantibus, in quibus flosculi emergunt candicantes circa ueris initium. Id non modò in aquosis & riguis locis prouenit, sed in hortis quoque, & circa itinera: sapore admodum acri. Alterum nasturtium aquaticum, maius dictum, folia habet multo maiora, primò rotunda: quum uerò adoleuerint, erucæ modo dissecta, satiuo nasturtio sapore proxima. In locis riguis, & potissimū circa fontium riuos discurrentes nascitur. Italis nuncupatur Sisembro aquatico et Crescione, Gallis Cresson, Hispanis Berros et Agriois, Germanis Brunkressen et Vvasserkressen. Vtriusq; icones à Matthiolo exquissitè proponuntur.

*Sisymbrium
cardamina,
Nasturtium
aquaticum
minus.*

*Nasturtium
aquaticum
maius.*

*Cresson.
Vvasserkressen.
se.*

Est & nasturtium dictum hybernum, maiori aquatico primum simile: quo autem huius folia æ-

*Nasturtium
hybernum.*

tatem consequuntur maturiorem, eo frequentius profundiusq; laciniantur, maxime caulem uersus, irionis modo, antrorsum uero cum quinque angulis in circumferentia uariant. Caulis autem altius recta excrescit angulosus, striatus, racemosus & flexilis, floribus in cacumine luteis, qui in Maio & Iunij initio florent: quibus pereuntibus, emergunt siliquæ oblongæ, rotundæ & erectæ, exiguum continentes semen. In hyeme nasturtij aquatici maioris effigiem refert: in acetarijs familiare. Dodonæus *Πευδοβώνιον* op Dioscoridis esse arbitratur, nuncupatq; Barbaræam, uel herbam S. Barbaræ: Gallis herbe de sancte Barbe dicitur, nostratibus Vvynterkerfs. Tres hæc nominatæ nasturtij species, in Scorbuti curatione sunt utilissimæ.

DE QUARTANA.



QUÆ rara obseruatuq; dignissima in febre Quartana animaduertitur, hæc fere existunt. Ex ueterum medicorum decretis, & posteriorum scriptis, sententiam adhuc inter nostri ordinis uiros præstantes hoc secundo perdurare constat, quæ hanc febrem, ut longissime, in duodecimum extendi annum censent: secus autem, ipso artis usu, obseruatione sedula, & ex empirum indubitatorum testimonio ostendam. Enim uero quendam agricolam nomine Henricum Hasen, in peninsula uulgo Steinsuert dicta, supra Embricam ad Rhenum, Quartana triginta tribus laborasse annis, ex eaq; interijisse intra annos non multos, ram

Auicenn. lib. 3. fen. 1. tra. 2. cap. 61.

Triginta tribus annis durare potest quartana.

tam in uniuersa illa uicinia notum est, ut in dubium minime uocari debeat: hac occasione & in coelibatu permanſit. Febris quandoq; dies aliquot, uel paucas hebdomadas intermittebat, ut lecto non affigeretur æger: ea tamen ſemper recurrebat. nam quæ in *Hippoc. li. 2. aphor. 12.*

Comitem à Morual itidem Quartana triginta tribus exercuit annis. Porro ſenex, aurci uelleris, Burgundis noti, inſignibus donatus, poſt dies tres expirauit. Mortem uero ex gaudiij magnitudine, ob honorem quo affectus fuerat, ſubſequutã ferebatur.

Dominus de Role, œconomus (ni fallor) Cæſaris Maximiliani, eius nominis primi, ea febre annis circiter octodecim laborauit, ab ea autem integrum ferme reſtitutus annum, interijt, quod ſibi prædictũ fuiſſe aiebat: mortem nimirum cõſequuturam, ubi deſiſſet febris. Cæterum quem ſeptimo anno Quartana enecarit, Nobilem noui: quemadmodũ & parochum, quinto anno ex ea mortuum. Quid enim uetat longioris durationis ſpaciũ? Perſeuerante ſiquidem & melancholici humoris generatione, & prauu uictus uſu, neceſſario eiufmodi requiritur effectus. Neque uero ex materia ſemel tantum coaceruata talem gigni ægritudinis prolongationẽ ſentio: niſi quotidie noua cauſæ acceſſione locupletetur: quæ quo maior eſt, eo temporis prorogatio diuturnior. Quemadmodũ ediuerſo, ſi quoq; cauſa minuat, uincat, tollaturq; (quod pro eius paucitate in corporibus alioqui non tam male affectis,

nonnunquam post accessiones non frequentes fieri potest) quare in paucarum septimanarum spacio morbus hic omnino abigi nequibit. Exemplis id comprobare facile, si actionum mearum præco dici amarem. Quare nec ullius prærogatiue momentum iactabundis Paracelsistis in eiusmodi curationibus relinquo.

Act. lib. 5. cap. 82. Aetius præterea Hippocratem de hebdomadibus citat, asserens, eundem hominem Quartana bis non laborare, neque laborasse unquam: neque laboraturum, si semel euaserit. At, Deus bone, quoties ego obseruavi, eundem bis hanc febrem fuisse perpesum, plurimum intercessione annorum? Documēto sit, præter obscuri nominis quàm plurimos, eximix & uirtutis & nobilitatis uir, FRANCISCVS A' LOE, dominus in Vvissen: qui licet Quartanam in ætate iuuenili excoxisset, nihilominus circa annum ætatis sue quinquagesimum, ea denuo correptus, ultra sex laborauit menses: sicuti tum ipse testabitur adhuc superstes, tum ego diligenter notauī, dum curationi interessē. Quid autem admirationis in hoc euentu? Non ego quidem inficior, difficiliorem esse Quartanæ repetitionē: propterea quod eius causa materialis ob sui substantiam crassam, uiscidam, faeculentam ac terrestrem, longa indigeat & tarda productione. Sed eam interim quæ pronunciem impossibilem, nulla adducor ratione. Nam affectis malè uisceribus, facile regenerari potest paulatim tantus materiæ delinquentis cumulus, quantus ad inducendam

ducēdam quartanam desideratur. Vnica enim ægritudinis perpessio, atq; unica materiæ morbificæ absumptio, eiusdem mali reiterationem excludere nequit.

Quod item medicinam facientes, Quartanam occidere, si sexagenariæ uel grauioris ætatis hominem apprehendat, pro rato ferè habeant: non ita perpetuum est, quin oppositum me docuerit exemplorū frequentia tum in uiris tum in fœminis. ex quibus uno hoc reliquum numerum terminemus, quod nobilis apud nos matrona Herteueldia, ætatis longè plusquam sexagenariæ, in autumno anni quinquagesimi septimi supra sesquimillesimum, in Quartanam fuerit delapsa: quæ & purgato & inuncto sæpius corpore, cōualuit. Sequenti insuper æstate eadem in grauem incidit tertianam, cum quotidiana cōiunctam, (dixisset quis Hemitritum) cui denuo meam feliciter præstiti operam, propinata ex syrupo acido & aqua card. benedicti potione; uacuato corpore cū rhabbarbari infuso, & electuario de succo rosarū: illinitis quoq; renibus, de quorum æstu impendio querebatur, cum oleo rosaceo & aceto: tandem etiā capiti admoto oxyrhodino. In promptu autē ratio est. Siquidem interficere nequit Quartana, nisi deficiat uirtus ad materiam morbi abolendam sufficiens: quæ certè non omnino desiderabitur ex paucorum annorum accessione. Etenim deprehendimus quandoq; iuuenes unā cum Quartana commori, quinquagenarios uerò periculo liberari.

Quid

*Quartana
senes non
semper en-
care.*

Quid ita? Nisi quòd hi, licet prouectiores, nullum tamen ex ætate sentiant uirium detrimentum: illi, quamuis iuniores, facultate uitali, ad copiosæ materiæ concoctionem requisita, destituantur. Senium enim certi anni proprietati semper assignari nequit.

In hoc præterea tractatu minimè oportuit prætermitti historiam raram, et quidem memorabilem, explicatuq; dignam. *Virgo Gy-
gantea ex
Quartana
reddita.* Virginem uidi, quæ ob molem corporis gyganteam per diuersarum regionum ciuitates circuibat, se uelut monstrofi hominis idolum seorsim in conductis ædibus uisendam ostentans omnibus qui stipem numerarent, ex cuius collectione hæc cum matre uictū quæritabat. Ad hanc ego quoq; ingressus, diligenti inquisitione singula percunctor: doceorq; ex matris & grandissimæ filiæ responso, eam ex staturæ breuis parente utroq; natam, nec ullum in auita progenie fuisse uisum qui communem aliorum hominum altitudinem superaret. eamq; uirginem à sui ortus initio, ad annum duodecimum paruæ staturæ uulgaris fuisse; sed eodem tempore quartana correptam. quæ cum mensibus aliquot luctata fuerat, ea prorsus remittente, cœpit in eam excrescere molem, cunctis membris equa dimensione in magnitudine debita respondentibus, ut nihil à iusta proportionem appareret alienū. Annum, ni memoria fallar, agebat uicesimum quintum, quum eam inspicerem, quo nōdum menstruæ fluxionis senserat euacuationem. Illum etenim sanguinem excrementicium in nutritionem, & tantæ molis

molis conseruationem requirebat natura. Bona interim fruebatur uale tudine, forma non uenusta, colore subobs curo, ingenio simplici & stupido, ac toto corpore torpido. Virtus siquidem animalis ab initio huic corpori à Deo infusa, in ea quæ uulgaris hominis amplitudini debetur, proportionè: postea in uasti corporis mole dispersa, æquali potentia sui operis robur nequiu it ostendere, quemadmodum in corpore mediocri.

Maior in exiguo regnat nam corpore uirtus:

ueluti etiam Homerus suum Aiace m, Virgilius Æneam describunt, figura paruos, artificio ingeniosos, quum omnes illis dotes tam corporis quàm animi tribuere statuissent. Virtus enim (ut philosophi loquuntur) coacta seu unita, fortior est seipsa dispersa. Quæ uero huius miraculi fuerit naturalis causa, etsi paulo à speculationis termino remotior, à nobis tamen ea adfertur: quod Quartanæ febres non præcipitem, sed prolixam sui sortiantur generationem. Argumento est tarda resolutio, quæ enim difficulter abolebuntur, facili priuantur ortus progressu: inter ortum & interitum est relatio. Videmus enim quartanarios, cõsumpta affectus sui minera semel, nec citò nec promptè in eundem morbum relabi. Lenta enim & copiosa eius materia longum coacervationi tempus requirit. Vnde etiã illud à priscis medicis quasi per manus traditum axioma: Qui semel Quartanam uicerit, hic tota deinde uita ab ea immunis erit. Eo posito fundamento, sceminam
f hanc

hanc dico intervallo longo congesisse quartanam;
 cuius generatio incrementi sustulit impedimentum.
 A natiuitate enim hæc increuisset cōtinuò: sed ueta-
 bat humor ille melancholicus, quo absumpto, natu-
 ræ institutū prīmogenias uires extendebat in cor-
 pus iam mundatum ac purum, quum sanguinis ali-
 mentum optimum à facie melancholica segregatū
 tuto attrahere posset. Exemplum præbent arbo-
 res. Eæ enim tabescunt, si uitioso humore furculus
 aliquis corrumpatur: parte uero amputata, uigorē
 denuo expandit stirps. Ita etiam corpus nostrum
 tabidum absumpta à *φύσις* malitia, auarè admodū
 haurit, imò deglutit alimentum, quo citius perpes-
 sum damnū reitauret. Vnde à conualescentia quar-
 tanarios multa deuorare, quasi exatiari possent nun-
 quam, cernimus: ita ut recidiuā inducat sæpenume-
 ro ingluuies nimia. Natura autem in hac fœmina
 externo cibo cōuenientius habebat nutrimentum,
 sanguinem scilicet menstruum, quem alioqui anno
 circiter duodecimo expurgari oportuit, quo magis
 apparere incipiebat moles ista gigantea: at eum iam
 sibi ad castigandam à *φύσις* referuauit. Et quia cor-
 pora diu extenuata non affatim reficere oportet, na-
 tura paulatim retinendis mensibus in nutritionis u-
 sum assueuit: ideoq; ob alimenti copiam, id corpus
 in tam stupendam statuam excreuit. Nam quum e-
 iusmodi fluxus ordinatus semel deriuat, uix postea
 suppletur. Etenim quum quartanarij ferè omnes,
 ubi conualuere, magis increfcere comperiantur, ni-
 si

fiætas aut relicta symptomata impediunt: tum sanè hæc foemina eiusmodi naturæ morioni magis exponebatur, ex alimēti largioris accessione; & quòd auctrix illa uirtus cōsopita ad tempus, postea ualidius suas exerceret actiones: sicut ignis paululum oppressus, liberior mox uehementiori insultu se prodit.

Et quid mirum, in adolescētia, circa legitimum tempus eruptionis menstruorū? Materia & forma sufficiente, quid tantæ molis fabricam remorabitur? Videmus enim corpora nō semper eadem increcere & proportionē, & tenore. Siquidem pleraq; primò proceritatem acquirūt, postea uerò crassitiem, & econtrā. Quum autem natura proceritati in primis sæpenumero incumbat; postea nutritionis subsidio destituta, relinquit corpus improporionatū, debile, & quandoq; ridiculum. Tale se uidisse narrat Iulius Cæsar Scalig. Mediolani, in publico nosocomio, post uictoriam sub Ludouico rege ad Laudempompeiam habitam. Iuuenis etenim erat tantæ proceritatis, ut stare nequireret: itaque iacebat, duosque lectos simul iunctos explebat: nam ad crassitiē & robur alimentum desiderabatur, de cratq;.

¶ Subiungam hic nonnihil de pernicioso telæ araneæ usu, in huius febris curatione: nec uideo quonam distinctionis consensu imitari debeamus Guielmum Vatignanam, quòd Rhafis testimonio ad Quartanæ profligationem prædicet telam araneæ, sicum uino potui exhibeatur hora unica ante con-

*Tela araneæ
noxia
assumpto
in Quartana.*

fuetum paroxyfmi insultū: quoniam eius usum nec grauioris noxæ periculo uacare, nec effectus suæ cōmendationi pares edere, experimento deprehendi.

Enintuero anno millesimo quingentesimo quinquagesimonono, muliercula quædam Hambachi in ducatu Iuliacensi, quum ex temeraria alicuius per suasionē hoc remedium improuide aduersus Quartanæ uiolentiā usurparet, in horrenda uenenositatis symptomata incidit: ad quam accersitus, præter alia medicamēta electam propinaui theriacam, qua postea sanitatis amissæ iacturam recuperauit. Deinde ne uel minimum huic errori patrociniū sugge-

Lib. 2, cap.

55

rere potest Dioscoridis auctoritas: quia in eius contextu duo subiicienda considerationi ueniunt. Vnū est, quod araneū quidem quartanæ circuitibus mederi tradat, sed extrinsecus saltē lacerto appensum, nō autem per interiora assumptum: alterum, quod solita quadam scribendi proprietate, nullā uel ipse met tribuat ueritatis fidem ijs rebus, quas citra ulteriorem censuræ suæ interpositionem affirmat sub personæ tertiæ prolatione: uti apparet euidenter in cap. de Basilisco, othonna, lapide Thracio, smilace aspera, trifolio, & id genus reliquis. Telam adhuc araneæ albam in corio ligatam, & collo uel super adiutorium appensam, quartanarios curare, scribit præter alios insignis medicus Petrus Bayrus in sua praxi, distinct. 20. cap. 6. Alij secus persuasi, curationem nimis superstitiosam contra Quartanę peruinaciam ex aranea usurpant, nūc nimirum putaminibus,

minibus, exempti nuclei loco araneam uiuam incli-
dunt, eaq; colligata suspendunt in collo, ac dies no-
uem relinquunt; inde in ignem coniiciunt cum ho-
rum uerborum additione, In nomine patris & filij
& spiritus sancti. Cæterum à primo inchoatę huius
curationis die oportet Orationem Dominicam, &
Angelicam salutationē certo recitare numero quo-
tidie: ut primò nouies, secūdo octies, tertio septies
repetantur, imminuendo usq; ad nonum diem, quo
semel ea referentur. Qui se hac incredulitatis ra-
tione liberatum fuisse, ac alijs deinceps quasi per ma-
nus tradidisse artem assereret, hominē leuicū noui.
Credulitatem, siue incredulitatem si lubet appella-
re id, perinde est: multum sæpe possunt, dum certis-
sima persuasione se mutuo inducunt, ut hanc cura-
tionis formam iuuare, firmissimè confidant, usur-
pentq; homines cōscientiæ nullius religionē ducti,
auxilium undiquaq; accipientes, siue à dæmone, si-
ue à Deo, modò subleuentur, flocci reliqua faciunt.

Hoc incredulum genus hominum transuersum a-
gi, & in reprobam labi mentem, ac consequi frequē-
ter opem requisitā, Deus quandoq; permittit: mul-
ta tamen seueriori olim redimendam, nisi respi-
scant maturè.

Obseruamus alios quoque nonnunquam succes-
sus in diuturno hoc malo, maxime si deliderio sin-
gulari quid appetatur: quod tamē non ita perpetuū
est, quin pro morbi uel excrecentis uel declinantis
tempore, siue pro corporū ratione, aut uirium mo-

*Quarta
ex aranea
curatio su-
persuasiua.*

do id uel iuuare plerunq; uel sæpe etiam opprimere experiamur. Enimuero qui halecibus semitoftis uiginti & uno, simul ante Quartanæ accessione in uniuersali morbi declinatione, uoratis liberaretur, intercedente tamen grauissimi paroxylmi insultu, mihi intus & in cute notus est. Erat autem hic natura impendio uorax, alioqui saburram hanc non tam illa se concoxisset, exonerassetq; quare & alius imbecillior ea oppressus, facile interisset.

Sunt qui arcano hoc antidoto tenaces Quartanguires se infringere gloriantur:

R. Olei uitrioli ritè apparati guttas septem,

syr. è cicorio ℥. i.

aquæ absinthij ℥ ij. s. misce pro haustu.

Quæ autem linimenta spinæ in Quartana ante accessionem feliciter applicantur calidè, eiusmodi sunt:

R. Ol. laurini ℥ i. s.

succi rutæ ℥ i.

uini sublimati opt. ℥ ij.

misceantur diligenter in uitro apto, quod cineribus imponetur primum tepidis: calor uero fotu paulatim lento augebitur, donec coctione linimenti consistentia appareat.

Item, R. Olei oliuarum

uini generosi an. ℔ i.

rutæ m. i.

uermium fluuiatil. ℔ s.

ebuliant, donec crassescat ut oleum.

Item, R. Saluiæ

rutæ,

ruta,

absinthij,

rorismar. an. m. s.

mastiches

olibani an. ʒ. i.

in uini maluatici & olei oliuarum an. cyatho coquatur, donec liquor cōsumatur: hinc ualida fiat expressio. Vsurpari quoque hic potest oleum de scorpiionibus.

Oseruationes has, enarratione nō inutiles, de quartanario Reuerendissimo episcopo Colonienſi, D. Antonio ex Comitibus à Schouuēburch, finiam.

Hic cōstitutione corporis sanguinea circiter annos natus quadraginta, ex alia febre in quartanā incidit, in autumnō anni millesimi quingētesimi quinquagesimi septimi, A qua ubi circiter uernum tempus nō nihil respirasset, huic neutra adhuc ualitudine freto, se insinuat Ambrosius ille magirus, annuū mendaciū libellorum, uel si mauis Prognosticorum plaustris notus nimis: qui eum quidē grauiter laboraturum prædixit, euasurū tamen, si a medicamētorum usu caueret. Interim uenā ille pertundi iubet, balneumq; præscribit. Confusus hic prognostico, opem medicā tamdiu respuit, donec a capite & finitimis partib. primū circa sinistram scapulam decubaret humoris copia: qui neglectus, lento defluxu musculos uentris sinistros interfecit: ubi excitata phlegmone, pus genitū copiosum putidissimūq; continuas partes decubitu sedulo uisitauit, tandem

Quartanus
episcopus
Colonienſis.

Abſceſſus
inter uen-
tris muscu-
los.

que

que ad læuum perinæi latus refedit, cum tumores
quâ chyrurgo sectus, ingentem fœdidissimi puris
quantitatē reddidit. hoc tamē postea nō nisi uentre
compressio fluxit: quare uiribus indies magis ac ma-
gis flaccescentibus, post septimanas tres, de uentris
inferioris incisione, ex cuius sinu pus defluere existi-
mabatur, ab ijs serio agitatur qui curationi intere-
rāt: rogaturq; Princeps noster clemētissimus, Dux
Cliuiæ, Iulix, &c. agrotum inuisens, ut eundem in
sectionis cōsensum induceret: eo etenim modo prō-
ptius liberiusq; sine expressione pus fluxurum spe-
rabant. Se, quid hac in re proficuum esset, non sa-
tis intelligere, respondit Princeps: at se missurum
eō suum medicum, medicinæ & chirurgiæ peritum:
cui si incisio probaretur, se quoq; calculum addde-
re. Proinde eō ablegatus, uulnere conspecto, cor-
pus emaciatū, uiresq; impēdio prostratas, cum pul-
su debili, ac de hora in horam magis inclinante, com-
peri. Quare nihil spei in sectione ponēdum esse, sed
extrema imminere iudicaui. Hora matutina, mortē
proximam significauit pulsus interceptus: contra
impudentes Fedronis Paracelsistæ calumnias, qui
pulsus animaduersionem ridet in mendaci famoso-
que suo libello Germanico. Paulo post hic in Do-
mino obdormijt: cui ex immēsa sua bonitate locum
in iustorum resurrectione largiatur Deus. Vētre
circa umbilicum inciso, tanta putidissimi puris co-
pia effluxit, ut ex uentris pleni cauo id exūdare iam
crederent, qui antea in ea opinione fuerant. At
sectionem

sectionem prosequuti, inter musculos trāsuersos & obliquos, uti dictum est, cloacam deprehendimus. In sinistro autem latere cor erat flaccidius, ex graui & continuo exhalante ferientēq; uapore putido: atro adhuc sanguine nigricabant uenę cor cingētes. In uesicę collo coctum delitescēbat pus album: quare nec urinam continere potuit aliquandiu, quod ad calculi lāSIONem referabatur: sed aliunde id cōtractum apparuit. In uentriculo quiddam instar humoris biliosi innatabat. Reliqua uiscera, uti & uniuersi corporis partes, uidebantur illaesa.

DE VARIIS PESTILENTIUM

diffusionum generibus, quę Anno 1564. & 1565. apparuere in quibusdam Germania inferioris locis.



QVOD cœlestis influxionis uariatio corpora humana imbuat dispositione ad difficillimum morborū iugum subeundum, manifestē quidem elici potest ex unico illo Hippocratis aphorismo, quo indicat, Mutationes temporū pātere potissimum ægritudines. At longē tamē manifestius id ipsum demonstratur præcedentium annorū consideratione, qui propter multæ humiditatis prædominium tristissimas uniuersalis mortalitatis clades nobis crearunt. Etenim præter frequentes puerperarū abortus, præter lumbricorum infestantiū cruciatus, præter arthritides & uiciatas articulorum motiones, apparuere uario-
la ac morbilli, quos tanquam præcursores sequeba-

Lib. 3. A.
phor. 1.

tur Epidemica lues incredibili grassationis sæuitia, adeo ut agros depasceret, oppida exhauriret, amplissimas etiam depopularetur ciuitates: ueluti satis superq; attestatur in Thracia Constantinopolis, in Ægypto Alexandria, in Gallijs Lugdunum, Londinum in Anglia, in Germania Dantiscum, Augusta, Vienna, Colonia, totusq; superior Rheni tractus, Basileam usque: quæ loca omnia exitiali sua contagione crudelissimè deuastauit. In his uerò nostris diuisionibus inferiori Rheno propinquis, pestis quidè mitior erat: sed interea graui morborum penitus pestilentium obsessione conflictabamur, qui maxime ex fluxionum causis dependebant: eo quòd externa humiditas tum cognatæ lubricitatis respectu facilè motionis procliuuitatem sortiretur, tum putrefactionis ansa uenenositatem acquisiuisset. Anno enim à Christi natiuitate MDLXIII, inuasere hyeme colli tumores externi, glandulosi, pituitosi, discriminis expertes: quibus postea incipiente uere successerunt, & per potissimam æstatis partem extendebantur, anginae crebrae, periculosa, & uelocis terminationis: quæ præterquam quòd malignitatis suæ contagione crudelissimis pestilentia insultibus penitus adæquarentur, tam etiam breui perdurationis decursu interficiebant, ut nonnullas deprehendere liceret saltem ephemeræ, aliquas triduas, uel quatri-duas, pauciores septenarias: at cæteræ octidui peridum excedentes, plerunque medelam receperunt.

Anginae pestilentes.

Qboriebatur primum cū febre & uomitu, ac potissimum

tissimum ex causarū πρὸς τὰ πλῆκωρ occasione, ut-
 pote nouilunio, exercitio corporis uehementiori,
 deambulatione per solis feruorem, alijsq; ex æstua-
 tionum focis: deinde momētanea accessione super-
 uenit linguæ tumor, loquela adimebatur ex obtura-
 tione laryngis: ipse etiam œsophagus arctissimè oc-
 cludebatur, ut ne uix quidē potū admitteret, mul-
 to certè minus cibi solidioris deglutitionē. quorū
 symptomatum confluxus ægros necabat strangu-
 latu: quo nullum mortis genus existit aut atrocius,
 aut calamitosius. Interea uero, præter paucissi-
 morum erysipelatum apparitionem, nullus in colli
 ambitu conspiciebatur tumor: sed intrinsecus consi-
 debat ferè semper uirulenti humoris defluxus, qui
 plerunq; excitabat phrenitidē, facta exhalationū
 cum cerebro communicatione. Sæpenumero e-
 tiam relicta priori in faucibus statione, ad latera sub
 cutem costas tegentem destillabat, unde lethalis Cy-
 nanches solutionem Pleuritis non minus mortifera
 consequebatur. Raro autem ad pulmones transfe-
 rebatur materia, quæ Peripneumoniam non minus
 tutam mox excitabat. Interdum quoque thorace
 relicto, ad spinam dorsalem conuertebatur, eiusq;
 dolorem gignebat intolerabilem, præsertim etiam
 in mulieribus menstruum effluuium patientibus
 (quod peculiariter notandum succurrit) quò diffi-
 cili symptomate propè liberabatur nemo, moriebā-
 tur plerique omnes. Tam malitiosum erat tenuissi-
 mi humoris uirus, ex cuius uehementia & cōtagio-

*Pleuritis pe-
 silens.*

*Peripneu-
 monia pe-
 silens.*

ne ob uenæ magnæ uiciniam sanguis uitiatus, ad proximas uteri uenas fluxioni menstruæ assuetas defluxit, erupitq; : unde & grauior in corpore ueneni facta commotio, & spirituum euacuatio. Obseruabatur præterea in pestilenti hac cynanche, pueros, quorum tamen ætas maximè huius ægritudinis erat particeps, prouectioribus minus periclitari, atque eos propè citius reliquis euasisse, qui decubitum in lecto negligebant: idcirco, quod horum relictio fortassis minus cõcepti ueneni, uel (si uoles) naturæ robustas uires argueret; aliorum autem obsequium, denotaret impotentiam ex ueneno seuerius eam ætatem infestante. Quantum curatiuæ methodi rationem spectat, uniuersalis corporis euacuationes, quæ præstantur aut pharmaci purgantis assumptione, aut phlebotomie usurpatione, plus legi-
onis quàm emolumenti inferebant: nisi quod in principio cucurbitulas sine scarificatione humeris collo-
proximis in teneriori ætate affixas iuuisse, & in alijs sanguinis è lingue uenulis extractionem quandoq; profuisse, conscius sim: adeo ut in hac angina Hippocratis præceptum fuerit repudiandum, lib. de Locis in homine, cuius hæc sunt uerba: Angina affectis, a uenis quæ in brachijs sunt, sanguinem detrahes; & simul aluum infernè subduces, quod id quod morbum committit, detrahatur. Quare exactius: considerata, curationem instituebam, partim corroborando partes inferiores aduersus fluxionum iniurias, partim ueneni pestilentis uim infringendo:
hinc

hinc & localium remediorū applicatione dissipando quandoq; id ipsum, quod immediate causæ coniunctæ præsentiam fouebat. Vbi tamen cautione summa opus est: alioqui hæc medicationis pars hic prætermittēda. Nam facile ex localium dissipantiū uel digerentiū potentia, hic humor sua tenuitate ad alia declinua uergebat loca, ut dictum est: ubi periculum conseq̃uebatur quoq; licet serius aliquando.

Porro nec hoc quidem silentio prætereundum est, quod dum tantopere sæuīrent & in alijs locis pestilentia, & in his nostris angina Epidemig: frequētissime hyeme præcedenti, noctu potissimum, apparuissent, aut celeri eiaculatione, aut constanti permāssione, horrendi & uarij in aere fulgores & typhodes: qui licet durante per totam æstatem lue nondū prorsus desisissent, euanuerunt tamen circa aduentū hybernæ constitutionis: quæ tam seuerō extremālgoris dominio nos tandem oppressit & deuastauit per integrum duorum mensium, eoq; amplius, spaciū, ut ab hominum memoria hyems nulla extitisse asperior censeatur. Quamuis autem ex hoc inaudita frigiditatis ambitu aer infectus pestilensq; ninceret, & pestis peruagatio mirè remitteret: palissim tamen ægritudinis prioris uice alia populariter coepit grassari: quemadmodum superiori quoq; anno, alioqui prorsus insolita, fereq; a prisca medicina scriptoribus incognita: quæ quum & ex humorum ad thoracem, eiusq; latera defluxione dependeret, & maligna sua infectione plurimos mortales

*Pluribus p
stentibus.*

corripere, trucidareq; , fortietur à me Pestilentis pleuritidis appellationem. Etenim ut plures eius erant differentiæ, ita multiplicium symptomatum comitatu cingebantur. Siquidem in hoc conueniebant, quod cuncti ægrotantes primum infestarentur feбри continua, ac pessimi moris: persentirent pungitium lateris dolorem, deniq; summa excruciantur anhelitus difficultate, & crebra respiratio nis repetitione: uerum & ratione expuitionis uarię, et facili partis affectę permutatione diuersitas cõtinebat. Nam statim ab accessionis principio dolor percipiebatur fixus, & certæ tantum inherens sedi: quideinceps uaga ac inconstanti motione serpetat per uniuersum thoracis circuitum, præcipue post unam alteram uel *duos* uel *tres* medicamenti applicationem. atq; postea celeri nihilominus transitionis impulsu conuertebatur ad pulmones: quibus ab impetuoso humorum affluxu inundatis, sputa prodibant sanguinolenta, mixta, diuersoq; colore aliquando tincta. quæ quanto maiori excretionis aut promptitudine, aut abundantia reicerentur, tanto grauior nobis minitabatur de amissæ ualeitudinis recuperatione diffidentia: propterea quod hos ferè in sexti diei fine obijisse notatum sit, antequam ad septimi iudicationem peruenirent. Alij autem reperiuntur hæmoptoicæ passionis expertes, qui ubi nonnum excelsissent, ferè ancipiti periculi euentu liberabantur: nisi malum reuocaretur forte recidię uicissitudine, qua plurimi interiëre ante tertiæ septimanæ

manæ terminū. Quinetiam, præter cætera accidentia, aliqui delirio tentabantur: nonnulli alui profluvio, quorum utrunque & Hippocratis testimonio & continuæ experientiæ documento, certa desperationis præfagia confirmant. Et cōtagiosi quidem huius morbi historiam, ut à nemine antiquorū descriptam comperio: sic à recentioribus, quod sciam, ne uel mentionem eius factam animaduerto, unico excepto illo Guidone de Cauliaco, qui ad perpetuam posteritatis memoriā (in cap. 5. doct. 2. tract. 2. suæ Chirurgiæ) similem Epidemicam luem recenset, quæ anno Domini nostri millesimo trecentesimo quadagesimooctauo extremā mortalitatis calamitatem toti fermè mundo inuexit, partim cum feбри continua & sputo sanguinis, partim cum anthracibus uel axillarum uel inguinum. Ex citati auctoris cautione deinceps Valescus de Taranta peruenit in obscuram rare istius ægritudinis cognitionē, sicuti attestatur ipsius appendix tractationi Pleuritidis subnexa. Verū, quia nullibi compendiosa medendi ratio traditur, existimabo me operæ præstiturum precium, si in testamentum sempiternæ recordationis, usumq; reipublicæ, paucis declarauero curationis nostræ modum, qui uarietatis respectu prorsus meretur obseruationis industriam.

Nam quum in Pleuritide præcipuū & euacuandi *Chiratio.*
& deriuandi materiā morbificā instrumentum suggerat uenæ sectio, hanc tamen ualde noxiam exitū ille deprehēsum est (uel ob uenenosi humoris agitationem

rationem motionemq; grauiorem, qua spiritus & sanguis uenenoſitatis promptius redduntur partici pes) cum primis in ea ſpecie quæ cum *αιμωνις* con iungebatur: quoniam ob humorum ad thoracē re tractionem, ſanguinis expuitionem impedire co gitur, cuius retentio maioris inflammationis anſam contribuit neceſſario. Vt uel hoc nomine pruden

Lib. 6. ſect.

3. particula

ultima.

ſpud.

ter & circūſpectē Hippocrates inter phlebotomiæ obſtacula enumerāſſe mihi uideatur lateris dolorē, tum ſanguinis ſputum, hoc contextus ordine: Con uenit quibuſdam ſanguinem detrahre tempeſtiue in talibus: in alijs autem, ueluti in his non conuenit. Impedimentum in ſpuentibus cruenta, tempus an ni, pleuritis, bilis. Qua differentiæ conſideratione propoſita, ſcēlicet expertus ſum ſucceſſum, phlebo tomiam his quidem interdicens, paucis uero ſua dendo. Ad hæc, Practici noſtri omnes paſſim in culcant, ad expectorationis facilitatē, utpote potiſ ſimam intentionē, nil eſſe conducibilius rerum dul cium, pectus lenientium, materiam apparantiū, ſpu tumq; promouentium & facile reddentium, lambi tione: quæ tamē inſtituto noſtro nequaquam inſer uire poterat, ob putredinis febrilis & ueneni peſti lentis augmentationē: quorum malignitati ſtudio maiori reſiſtendū erat, quā ipſius Pleuritidis uio lentix. Itaque contra communis Canonis obſer uationem, conſului rerum acidarum exhibitionem: ut ſyrupi ē ſucco acetofg, & de acetofitate citri, cum aqua cardui benedicti & ſcabioſg, & ſimilium. De inde

inde præscripsi potiones pectorales, ex medicamen-
torum amarorum admixtione confectas: ueluti car-
dii benedicti, scabiosæ, scordij, melissæ, cicorij, o-
xyos Plinij, acetosæ, & eiusdem generis pluriū. quæ
non solum materiam pulmonibus impactam edu-
ctioni preparāt, uerū etiam pestilenti symptoma-
ticæ febris essentiaē aduersantur. A decoctione
expressa additur saccharum purum cum aceto mo-
dico, & post leuē feruorem denuo per cribrū se-
taceum trañjicitur. Ab ijs, quibus potenter alius
deijcitur, abstinentium, tam ob cōcepti ueneni exa-
gitationem, quā uirium deiectionē. Conferunt
autem uel clysteres, uel rhabarbarum infusum in a-
quis prædictis, si liquori expresso syrupus rosatus
solutius admisceatur. Conferunt & pillulæ com-
munes, quas pestilentialia dicunt. Antidoti hic non
inutilis forma hæc esto.

℞ Theriacæ elect. ʒ. i.

boli armeni ueri, cum aqua card. bened. aliquo-
ties loti, ʒ. ij.

Specierum diamarg. frigid. ʒ. iij.

sem. citri

scordij

scabiosæ an. ʒ. i.

Rasuræ monocer. ʒ. i. cum syr. de succo acetosæ:
fiat conditum, cum dictis uel aquis uel potionibus
usurpandum. Celebratur antidotum quoque in
eiusmodi morbis pestilentibus non inidoneum, Ca-
nonici cuiusdam Lotharingi, qui contra pestis sæui
h tiam,

tiām, eo usuram haud uulgarem fecit apud Principes & Ciuitatum respublicas insignes: quanquam fucum interim subiunxerit, dum uarijs uarie formulæ præscriptum, uelut semper unicum, nec alijs unquam cōmunicandum, multo auro diuendit. Quæ autem à potentissimo Principe, honorario certè liberali redempta est, sic habet:

℞. Specierum laticia Gal.

terræ sigillatæ an. 3. i.

holi armeni præpar. 3. s.

theriacæ Andromachi 3. iij.

Conseruæ rosarum

borrag.

buglofs. an. 3. i.

Syrupi uiolarum quant. suffic. fiat electuariū.

Victus hic, qui in peste, conuenit.

Anno 1565, mens. Ianuar.

DE CURATIONE FEBRIS MA-

ligna, in qua de pulsus intermistentis præfatio di-

spiciatur.

UT GERVS à Randvuick nobilis, ætate plus quàm quinquagenarius, temperamento biliosus, incidit in febrem summe malignitatis: quam statim ab inuasionis principio comitabatur continuus uomitus materie biliosæ, uehemēs linguæ ariditas, sitis, inquietudo, intolerabilis æstus uentriculi, cum frequenti eructationum.

tionū repetitione, quæ per interualla gulæ commu-
nicabat angustias, & coarctationem difficillimam,
nō secus quàm si integri oui interpositione meatus
fuiſſet obſtructus: adeo ut æger ob cauſæ morbiſi-
cæ ignorationē, uereretur inopinatæ ſuffocationis
periculum. Pulſatio arteriarum deprehendebatur
ualde & inæqualis, & inordinata, uſque ad ſeptimū
diem, quo percipi cœpit Intermittens: cui quadam
motionis uiciſſitudine caprizans ſuccedebat. Sed
hic nōdum arripui deſperationis anſam, licet haud-
quaquam me latēret Galeni de hoc ſigno iudiciū
prorſus formidabile.

Ad medelam huic affectioni præſtandam accitus,
neglecta ſanguinis detractiōe, quam hoc anno in
quibuſcunq; malignis & peſtilentibus morbis etiā
circa Rheni tractum crudeliter graſſantibus pericu-
loſam compereram: ilico exhiberi iubebam antido-
tum cum aqua card. bened. tum in malis contagio-
ſis familiarem, cuius deſcriptio talis eſt:

℞ Theriacæ electæ ℥. iij.

rad. tormentillæ

baccarum iuniperi

ſem. card. bened. an. ʒ. i. s.

boli arm. præp. ʒ. s.

diamarg. frigid. ʒ. ij.

ſem. acetosæ

citri

raſuræ eboris an. ʒ. i.

ſyrupi de acetoliſit, citri q. ſ.

Fiat conditum;

h 2 unde

Antidotū
contra pe-
ſtem.

unde prouocato abundè sudore meliusculè habuit.

Tertia die, qua primum accessi ad morbum, penitus ocularis inspectionis fide considerandum: atque tum obseruata maxima humorum putredine, & apparentibus incendijs aduersionisque grauioris indicijs, ordinavi decoctum ex hordeo, card. benedicto & scabiosa confectum, admixto saccharo & aceto in formam syrupi acidi, quo assidue utebatur: quandoque haustum ex stillaticia card. benedicti, & oxalidis aqua bibebat. Nutriebatur ptissana subacida, auenato in aqua cum pauxillo aceti præparato, ac tandem iusculo pulli gallinæ simplici, in quo uitellus oui erat dissolutus: assumpsit quoque succum mali Punici.

Quinta die contexto diligenter corpore, exhibitæque aqua hordeacea dulcorata, copiosissimè profluxit sudor: qui mirè ægrotantem subleuabat anxietatis continuæ molestijs. Sexta, per secessum prodibant excrementa penitus biliosa, cum foetore magno, adeo ut natura materiæ peccantis diminutionem paulatim moliri iam uideret: sed impedita fuit ab insultu noctis subsequenti, qua symptomatum omnium concursus ingruerat tanta & uehementia & celeritate, ut æger condito ultimæ uoluntatis testamento, migrationis euita momento intenderet.

Septima rediens manè, in acerbo consanguineorum astantiumque luctu, citra ullam dilationem digitis carpo admotis pulsum percipio, intermittentem tertia quaque pulsatione, qui primo quidem contactu terrorem incutit: at examinatis interea cætero-

rum

rum accidentiū præfagijs, indeq; certa conualeſcentiæ ſpe data, quicquid discriminis portendebat uariata illa cordis & arteriarum motio, id totum retuli ad acerrimam naturæ cum uimorbi concertationem. Neque proſecto coniecturam meam euentus rei ſefellit: quoniam reliquo diei decurſu expulſrix facultas occupabatur planè in exonerando ſtomacho à noxia materiæ aduſtæ multitudine: animaduersione habita primò ad uirtutis corroboracionē, odoratu mala arancia, aquam roſ. & acerū roſaceū obtuli: deinde ad iuuanduū naturæ conatū in ciendo uomitu, exhibui aquam tepidam cum oleo comuni, & aranciorum ſucco mixtam. Inde ſeroſa quidem recrementa nonnulla remanarunt. ſed quum minera mali nondum attingeretur ſatis ab imbecilliori hoc medicamento, aut eius tenaciſſima malignitas infringeret: ſequenti die (qui octauus numerabatur) deliberato animo, & pulſus intermiſſione quauis perſeuerante, miniſtraui portionem purgantem ſequenti modo conſectam.

℞. Rhabarb. el. pul. ſenæ laxatiui, an. ʒ i. s. Infundantur ſeorſum in aquæ endiuizæ ʒ iiij. s. horis decem. poſt fortem expreſſionē colaturæ, admiſce ſyr. roſ. ſolut. ʒ i. miſce.

Et quia mentio incidit pulueris ſenæ ſolutiui, cuius uſum in hac inferiori Germania ego primus introduxi, eius deſcriptionē lubenti communicatione obiter ſubiungā: ut quibus uiſum fuerit, in ſuis præparent pharmacopolijs.

fol. senæ purgatæ

tartari albi an. 3. l.

fem. anisi

gariophylloruna

cinnamomi

galangæ an. 3. l.

diagridij 3. ij.

Comminuantur minutissime in puluerem, secundum artis legem; cuius dosis est 3. ij. in substantia; & 3. s. in infusione.

Ex superscripti pharmaci assumptione, sexies æger per aluū excreuit flaua, biliosa, adusta, foetida, cū sedatione omnium symptomatum: ut etiam testaretur sensibili percepuone, sese liberari ab ingēti pondere incensi glomeris, per intestinorum longitudinem a uentriculo delabentis. Postea roborauit intrinsecus conseruæ rosacæ exhibitione, foris uero illinitione olei rosacei immaturi. Conualuit probe nobilis hic & optimus uir, post uniuersalem corporis euacuationem: saltem pulsus intermittens perdurabat adhuc in nonum usq; diem, quo commutabatur in paruum, rarum, tardum, qui necessario debilitatem sequebatur ex mutua naturæ & ægritudinis colluctatione natam. Proinde manifestissime apparet, hanc prædicendi cautionem a Medicis esse obseruandam, ne animo penitus perculso & commoto de ualeitudinis recuperatione confestim diffidant, si quādo eiusmodi pulsus sensui occurrat, cum causæ quidem morbificæ magnitudinem, & ancipitem oppugnantis naturæ luctam denotet, nō tamen


mortis propinquitatem, nisi plurimum lethaliū si-
gnorum tanquam ~~texarum~~ accessione confirme-
tur artificiosa coniectura. Etenim prius quam ul-
lum ab ore procedat præsagium, duo in considera-
tionem ueniunt: naturæ robur, & uis morbi. Quia
tum demum animal interitus perceptionem subit,
quando illud succumbit, hæc uero uictorie insignia
ostēdat. Verbi gratia: Statuamus ægritudinis cau-
sam aut parē esse naturæ, aut imparē. Par si fue-
rit, non apparebit conuersio uel ad salutem, uel mor-
tem: quia mutationis omnis proprietas consistit in
unius prædominio. Si igitur impar, tum aut mor-
bus uincet, aut natura. Si natura, euadit æger, si mi-
nus, morietur. Mortem enim inuehit defectus natu-
ræ, exuperantia causæ morbi. Iam pulsatio-
nis omnis continuatio, significat facultatis uitalis
robur: defectio autem, eius imbecillitatem. Itaq; si
binam pulsationem exhibuerit tactus, bini numera-
buntur gradus roboris: si una intermissio, unus gra-
dus morbi. At unus gradus minime exuperare po-
test duos, in actionis ordine. Vnde pulsus, licet ter-
tia quaq; motione intermittens, non arguit imminē-
tis mortis certitudinem: atque multo sanè minus il-
le qui decem aut uiginti dilatationum & contractio-
num repetitiones tantum sequitur. Siquidē, ubi id-
ipsum priuatur pernicipi suæ exequutione, quo ta-
men maior conspirat efficientis potentia & uicini-
tas, qui nam declarabit operationis efficaciam aliquid
pusillum, longēq; ab agendo remotum? Talis enim
depre-

deprehenditur frequēter in febris pestilenti & ægritudine melancholica, frequentius adhuc in palpitatione cardiaca. Qua decepti Gallix medici, Marino de Caballis, Reipub. Venetæ ad Francorum regem legato interitum prædixere, sinistro de pulsus intermissione iudicio irretiti: ideoq; suaserūt, ut post impetratam discessus licentiam, in Italiam cōfestim rediret: atq; ibi condito testamento, dispositisq; negotijs, tranquillior deinceps sese armaret ad quodcunq; mortis momentū. Ille Venetias animo prostrato reuersus, consultationem instituit, accito medicorum collegio; ex quo erat Victor Trincauella, celeberrimus facultatis nostræ in Patauino gymnasio professor. qui quum animaduerneret tremorem hunc proficisci tum ex grauiorib. curis, tum ex sanguine melancholico ad cor affatim confluyente: promittens amissæ sanitatis recuperationem, crebram consuluit incisionem uenæ, quam necessario postulabat plethorica corporis constitutio. Hinc accedente etiam cordialium remediorum usu ritè curatus, in hodiernum diem adhuc superstes est clarissimus uir, omnium rerum gnarus, plurium idiomatum peritus, defunctus interea magnificentissimè munij legationis ad utrunq; Imperatorē Turcicum & Romanorum, nec non Patauinæ urbis præfectura. Ea mihi narrauit filius meus Henricus Vvierus, philosophiæ & medicinæ Doctor; qui propter assiduos studiorum labores Bononiæ incidebat in similem palpitationis Cardiacæ affectum, cum pul-

suin-

fu inordinate caprizante, & sæpius intermittente
sed uenæ sectione, uirtus legeritè obseruata, assum-
ptis quoque ijs quæ ex artis nostræ præceptis con-
ducibilia iudicabat, integram sanitatem ex singulari
Dei gratia est consecutus.

DE HYDROPIſ CURATIONE.

 VONIAM hydropica affectio uix alibi
frequentiori, magisq; populari impetu
tyrannidem suam exercet, quàm in hisce
Germaniæ inferioris partibus: uolui hoc
loco Obseruationum quarundam mearum, profe-
cto non inutilium, formas in huius morbi curatio-
ne adiungere: quas eo procliuiori mentis studio cui-
cunq; bene uolenti gratis expono, ne pro meo quali-
cunq; modulo posteritati defuisse uidear. eundem
animi candorem ab alijs desidero. Cuilibet interim
suum non illibenter permitto iudicium. Quum
uero pro diuersa hydropis specie postuletur diuer-
sa etiam medicatio, primum dicemus de Ascite: in
qua, propter materiæ uentriculo & hepati propin-
quæ tenuitatem, promptitudinem & copiam, non
requiro longam multamue concoctionem, sed sta-
tim ad aquei humoris euacuationem festino. Et
præter alia, hic mihi in usu est Gratiola herba: quam
licet ualde amaram, & propterea minus delicatam,
in substantia exhibere queunt alijs ad ʒ ij, cum pulue-
ris cinamomi & sem. anisi momento, saccharo, & ui-
ni haustu: ego tamen in uino decoquo manipulum
i cius

*Gratiola
usus in hy-
dropic.*

eius paruum, seu unciam semissem, cum uuis pafsis, acinis exemptis: & a forti exprefione admixta cannella, anifo & faccharo, hora matutina propino.

Vel hac ratione apparari potest:

℞. Gratiolæ ʒ s.

foldonellæ ʒ i.

fem. anifi ʒ ij.

passul. enudeat. ʒ s. bulliant cum uino, ad remanentiam ʒ v. Liquor expreffus exhibeatur.

Potens istud est pharmacum, quo serofarum & aquarum superfluitatum libræ non pauciores octo quandoq; expurgantur.

Proximū potentia ac bonitate *καταρχητικὸν* succedit, succus radicū iridis ex loco sicciore collectarum, mundatarum, contritarumq; residendo depuratus: qui cum oui gallinacei uitello diligenter commixtus, albumine prius effuso, ex testa tepidè sorbeatur. Vel paretur sequens haustus:

℞. Succū iridis per residētiā parū defecati

ʒ iij. uel ʒ s.

syr. rosati solutiui ʒ i.

cinamomi electi ʒ i. misce.

Electuarium itē præstans in pellenda aqua faburra, cuius & Matthiolus meminit. In diebus canicularibus succus ex cucumere asinino expreffus, soli in uase exponatur, donec siccescat, humore supernatante subinde effuso. Accipe succi huius siccati, bdellij an. ʒ i. mastiches ʒ s. salis gemmæ ʒ ij. incorporentur. Hinc fabæ instar pilula pro do-

si con-

si conficiatur, deglutiatur'que.

Dantur item pilul. aggregat. ℥ ij, cum elaterij gra. ij. hinc cum hydromellitis guttis pauculis fiant pilulæ vj, super puluere sem. anisi.

Succus item è radicis sambuci uel ebuli cortice *Sambuci & ebuli uirtus.* expressus, hic confert. Conficiuntur in eundem quoq; usum ex hoc succo pastilli. Decoquitur item utriusq; radix in uino. Semen adhæc, per diutinas aque lotiones à baccarū succo nigro expurgatū, siccatum, & in puluerē redactum, ad drachmæ unius pondus plebeijs propinatur cum uino, cui cinamomi ℥ i. & sacchari quantum uoles admisce.

Cortex etiam utriusq; interior flauescens delibratur, uulgoq; hic usurpat. Redigitur & ebuli cortex in puluerem, eiusq; drachma una cum aque liniaræ ℥ iij propinatur: unde uel per urinam, uel etiam sedem, aqua cutim subiens, potenter expellitur.

Frangulæ, à clarissimo Matthiolo descriptæ, uti *Frangula.* litas hic nō uulgaris: cuius cortex interior decoquitur cum eupatorio, absinthio Rom. cuscuta, ueronica, radic. cicorij, sem. apij & foeniculi, adiecto postea cinamomo.

Efficax hic item uitis syluestris radix.

Quem stibium artificiosè præparatum delectat, *stibium.* hic eius translucidi, ad modum lapidum granati uel hyacinthi, grana tria aut quatuor infundat noctem unam in uini uncia, aut paulo amplius: deinde per linteum colato uino, admisce pulueris canellæ electæ pauxillum, atq; bibatur.

Vitrioli o-
leum.

Sunt qui olei vitrioli guttam, in uini cyatho hydropicis propinant, idq; magni arcani loco habent.

Innoxium magis erit, si uigilanti preparatione oleum dulce redditum fuerit.

Porro hoc obseruandum, singulis septimanis ut minimum semel tentandam esse euacuationis repetitionem, ne uenter mox denuo saburræ aquæ affluxu exundet.

Quando autem paulatim uentrem & hepar exonerari desideramus, aut propter humoris delinquentis abundantiam, aut labefactatam uiscerum uirtutem, aut plurium symptomatum concursus: præscribere tunc consueui apozema magistrale, in eiusmodi propere formam.

Apozema
magistrale.

℞. Rad. ualerianæ
pimpinellæ
helenij, uel enulæ campanæ,
ebulian. ʒ s.
uiris syluestris ʒ ij.
medullæ sem. carthami ʒ v.
sem. anisi ʒ s.
fœniculi ʒ iij.
gratiolæ
cupatoriij uerian. m. s.
ueronica
scabiosæ
betonica
card. bened. an. m. s.
fl. genistæ

fambuci

sambucian. p. ij.

passul. enucleat. uel Corinthiac. incis. ℥ i. s.

sem. Alexandr. expurg. 3 vi.

soldonellæ ℥ i.

agarici in pastillos redacti 3 v.

Decoquantur in lb v. uini albi maturi, ex artis præscripto, si febris uel causa calida absit: alioqui in aqua, donec absumatur medietas, in uase diligenter tecto, uel potius duplici: à forti expressione, in decocto buliat denuò saccharum, sufficiens ad potus conseruationem, uel mel Hispanicum aut Liuonicum despumatum, suspensa in linteo rhabarb. electi ℥ s. inde admisceantur pulueris cinamomi electi 3 iij. Hinc quotidie, uel alternis diebus, uel cum longiori interstitio, pro operationis modo, hauriantur tres uel quatuor unciae.

In eandem rem aliquot taleolæ radices iridis macerant in uino albo nocte: postridie uero huius uini haustus bibitur hora matutina calidè, identidem reliquis diebus, non sine magno ægroti commodo.

Recentes item huius radices saccharo aut melle conditæ, ad unciam quoq; exhibentur. Huc quoque facit tale ex ea cōditum, si quotidie, uel alternis diebus inde matutina hora uoretur semiuncia.

℞. Succirad. irios ℥ s. canellæ, galangæ an. 3 *Conditum*
ij. gariophyl. maceris an. 3. i. zedoarię 3 ij. soldonellæ *exiride.*
elect. ℥ s. in puluerem trita, misce cum melle despumato, ad electuarij formam.

E' baccis quoq; sambuci & ebuli, à semine expur

Succus
Baccis sam-
buci & c.
ebuli in spis-
satum.

gatis, & per colum traiectis, succus cum pauco mel-
le despumato uel saccharo coctione spissescit, hic uti
lis. Stillaticia item utriusque radicum aqua artifi-
ciosè extracta, ad 3 vi hausta, commendatur. Pri-
ma adhuc arborum harum germina, uel folia adhuc
tenella leuiter bullita, in acetarijs hic cum successu as-
sumuntur; quæ in eundem usum etiam olerum mo-
re coquuntur. Profunt & uina ex chamelæa &
thymelæa facta.

Brionia u-
sus.

In hunc finem præterea infunduntur quandoq;
à plebeijs in uino, taleolæ radicis brionia, ex quo
haustum manè assumunt: cui si cinamomi & mace-
ris parum misceatur, minus noxium erit.

Apparantur item pro imbecillioribus olea, lini-
menta, emplastra & cataplasmata, quæ admota uen-
trem ab aquæ saburra exonerant: quorum substan-
tia est colocynthis interior, chamelga mezereon nū-
cupata, thymelæa, esula, & reliquæ tithymali speci-
es, ricinus, peplus, gratiola, ueratrum nigrum, suc-
cus cucumeris erratici, radicum iridis, brionia, uitis
syluestris, sambuci, ebuli, scammonium, euphorbi-
um, et aloë: quæ cum melle, uel felle taurino, aut oleo
liliorum, aut laurino, siue rutaceo uel irino, aut alio
liquore conuenienti, ad quancunq; uoles consisten-
tiam uel formam coquantur. Prodest hic quoq;
oleum de mezereo Mesues, & unguentum ex artha-
nita recens. Sed pro materiæ applicatæ uehemen-
tia, ea uel diutius, uel breuius in uentre erit relinque-
da, regione hepatis semper libera.

In

¶ In Anasarca usurpamus ferè eadem purgantia medicamēta: sed in Tympanite talia exhibemus, quæ unà cum moderatiori humoris aquei euacuatione flatus dissipant. cuiusmodi inter reliqua est, Electuarium Indum maius: cuius 3 vi, cum pulueris soldonellæ 3 s, & uino, uel aqua rutacea, aut ex camomillæ floribus, uel alio liquore idoneo exhibentur non inutiliter. Si uero deprehendantur intestina affici lumbricorum rosione, quod aliquando usuuenit, maximè in Anasarca, semē absinthij Santonici non temerè additur. Postridie cuiuslibet euacuationis assumi iubeo theriacæ ueteris, uel mithridati 3. i. aut 3 i. s.

Vretica insuper hic unicè prodesse constat. Verum de ijs quæ communiter nota sunt, ut ferè toto hoc Opere, nihil dicam: raris solummodo observationibus contentus. Efficax hic cum primis est oleum è iuniperi baccis purè extractum, & cum uino sumptū: item lixiuium è iuniperi cineribus & uino apparatus: conficitur & ex sarmentorum ac genistæ cineribus, atq; cum saccharo & canella frequenter per manicam transfunditur. Datur à plerisque etiam petroleum cum uino: quod urinam, sudorem & uomitum mouet. Memini adhæc, ubi Romæ marito Ascite diutius excruciato, puluerem bufonis uisti, ut ueneno tolleretur, sumptuum pertæsa uxor exhibuerit: unde copiosum hic lotiū reddidit, hinc ipsa denuo eundem propinat puluerem, ut citius ærumnosam sumptuosamq; uitam cum subita commutaret.

*Oleum iuniperinum.
Lixiuum.*

Bufonis puluis.

mutaret morte: qui ab uberiore aqua confertim per
 uesicam exoneratus, præter coniugis expectationē
 conualuit. Sunt item, qui propinant decoctionis
 radicum diureticarum ℥ iij, cui admixtæ fuerunt
Canthari- sem. lini ℥ iij, correctorię scilicet, & cantharides dug
des. simul decoctæ, sed prius simul colantur.

¶ Medicamēta quibus uiscera roboro, mihi, præ-
Roboran- ter electuaria nota, in usu sunt in Ascite & Anasar-
tia. ca: Conserua radicum helenij, ac radices eadem
 conditæ: conser. absynthij Rom. zinziber Indicum
 conditum, radices pimpinellæ conditæ. Aut eius-
 modi præscribo mixtionem, ut plures simul inten-
 tiones compleantur:

℞. Conser. radicum enulæ ℥ i. s.

absinthij Rom. ℥ i.

specierum diacina momi ℥ i. s.

dialaccæ ℥ i.

olei iuniperini ℥ ij.

cum syr. de eupatorio quant. suff. fiat conditū.

Aliquoties uini sublimati usum permitto, maxi-
 mē in Hyposarca: cui canella incisa, galanga, cala-
 mus odoratus, zinziber, uel simile quiddam, imo &
 panis mica cum saccharo mixta, simul deglutiuntur.

Si ex splenis consensu hydrops oboriatur, prode-
 rit sequens medicamentum:

℞. Conf. rad. enulæ ℥ i.

chamedrytis ℥ vi.

specierum diacapparon ℥ ij.

dianisi ℥ i. s.

dialaccæ

dialaccæ ʒ ij.

syr. de radicibus q. s. misce.

Ipsa lienis regio unguento è bryonia contra sple-
nem, cui oleum rutaceum, & è capparibus admixtū
fuerit, linitur. Et si tensa fuerit hæc pars, applica-
tur emplastrum diachylon cum gummi, commixta
medietate emplastri è meliloto, affusis pauculis olei
spicæ guttis.

In tympanite mihi commendatur electuarium è
baccis lauri, quod flatus plurimum dissipet. Vel
fiat eiusmodi compositio:

℞. Elect. è baccis lauri ʒ. i.

conf. rad. enulæ ʒ. s.

specierum dianisi ʒ ij.

diagalangæ

diacymini an. ʒ. i.

olei iuniperini ʒ. s.

syr. de eupatorio q. suff. Misceantur.

Vel olei ex sem. anisi aliquot guttæ, hauriantur *oleum anisi*
cum uini momento. Vel electuarium apparetur si
tale:

℞. specierum dianisi

diacymini an. ʒ. i. s.

diagalangæ ʒ. i.

saccari puri ʒ. iij, quod dissoluatur cum aqua
rutæ. & post iustam coctionem affunde olei
anisi guttas sex, & misce diligenter: deinde fun-
datur in marmore, fiat electuarium in rotulis.

Proficit item ex fœniculi semine oleum; item ma-
k ceris

ceris oleum. Commendatur & nucū oleum recēs, cum generoso uino uel sumptum, uel iniectum.

Ventriculo
applicāda.

Inunctiones mutantur pro uisceris affecti constitutione. Ventriculus enim studiosè illiniť oleo absinthite & mastichino, quibus pro ditioribus admisceto tertiam aut quartā partem olei maceris. Deinde huic feliciter applicantur sacculi, ex absinthio, menta, saluia, ruta, corticibus aranciorū malorum, sem. fœniculi, & cumini, concinnati: qui prius ualde incalescunt, si lapidi ignito ollæ imposito tria aut quatuor uini cochlearia infundant: & mox olla hac sacculo tecta, ne ulla ex parte uapor expiret, tantum caloris hic concipit, ut uentriculo aut uniuerso etiā uentri impositus, suauissimum præbeat fotum. Suspenduntur & scuta quæ uocāt Stomachalia, sed uehementia ea esse oportet.

Hepatis locus oleo absinthite, & nardino, cum olei maceris pauxillo, inungitur.

In Tympanite uero totū uentrē primū quā diutissimè, donec rubor exciteť, linteis calidis, uel manibus carnosis, calentibusq; fricuisse, ut poris apertis flatus tenuati exhalent, confert. Vtiles autem sunt eiusmodi frictiones in quacunq; hydropē, quod aperiant, extenuent, discutiant, & exiccent: deinde uel uino sublimato, uel oleo laurino & rutaceo cum calidissimè, & perquandiu inungi oportet: postremo, sacculi queunt applicari ratione paulo ante dicta, ex ruta, absinthio, sem. cumini, anisi, fœniculi, dauci, floribus camomil, meliloti, sambuci, anethi, roris.

roris marini, stecados, confuti: uel spongiæ amplæ, aut pannus laneus crassus, prius in uinum aut lixiuium immersus & expressus: cui præcedentes herbe, semina & flores fuerint incocta. hoc autem ante inunctionem faciendum. Postremo adhibeantur emplastra, uelut è baccis lauri. Affigitur etiã aliquoties umbilico, sine incisione, cucurbitula magna, cū larga flamma.

¶ Caterum, duo etiamnum reliqua sunt præcipua totius curationis capita, quæ si ritè obseruentur, mirè conducunt. Primum est, in toleranda siti *sitis toleranda* constantia, quam stricta adeo lege impero, ut ægris nō *da* ultra libram unam cum dimidia uini in quemlibet diem permittam. Minori molestia hic obedire queunt, si ex angusti oris uitro bibant. humectata etenim sapius uini stillantis momēto lingua, promptius fallitur sitis, nec eius copia grauatur uenterculus. Manduntur in hunc usum & passule, diutiusque in ore detinentur. Sic & glycyrrhiza existit & *Asiatica*, maximè recenter effossa: uti pastilli quoque ex eius succo cōcreti, si ore retineantur, quousq; liquefiant. Lapillis item ex uino assumptis, eandem ob rem lingua quandoq; colludit. Vinum autem sit album, maturū & potens. Confert plurimum quoque helenites, absinthites, & aromaticum.

Alterum, & ferè maximū, erit sudor: quem quomodocunq; quantum fieri poterit, extorquere oportet. Theriaca postridie purgationis cum uino calido propinata, ut dixi, huc facit. *Sudor mouendus.*

etiam hîc mirè commendatur succus è rapo rotundo, in pila contuso & expresso, cōditus saccharo & cinamomo, ut aliud gustanti quàm rapum referat: hic manè ægro bene coōperto propinatur. Radix item hirundinariæ pondere semilibræ, per noctem in uino macerata, & deinde usq; ad tertias decocta, manè iciuno stomacho pota calida, aquam intercutem sudore copioso mirifice expellit. Eodem modo uinum cum ueronica apparatū, ualet. De chymici cuiusdam pulueris sudorifici potētia, aliàs fortassis dicam.

Extrinsècus insuper sudoris profluuium, multipliciter molior: idq; pro ægrotorum diuersa conditione. Tenuioris siquidem fortunæ hominibus cōsulo, ut mensæ incubans corpus uniuersum in clibanum, recenti pane extracto etiamnum tepentem, immittatur, sicut caput extra præfurnium puluinari innixum, liberè respiret, ne calidiori aere suffocationis periculum subsequatur. Vt is quoque citius promoueatur, & tibiarum inflatio simul discutiat, arenam in lebetè uel cacabo calefactā, siue etiam cineres quercinos eodem modo calentes, in sacculum infundo, cui colligato imponuntur crura tumida uesperì, atque similiter manè. Silices item calentes, inuolutosque linteis in lixiuio quercino uel uino madefactis, utriusque axillæ sinui & pedum plantis applicari, brachijs in thoracem remissis, tibijsque sibi mutuo incumbētib; iubeo: atque earratione è corpore diligenter recto promptius sero-

sa

sa recrementa eliciuntur, uel potius extorquentur.

Alius horum exprimendorum modus mirè utilis, et certior existit, si cupa idonea prius igne uasi imposito incalcescat, tecta lodice aut panno denso, uel operculo ob tumidum corpus commodo. In hac, super sedecula insideat æger, thorace & collo ita munite, ne quid uaporis exhalet; deinde sequens decoctum in cacabo uel uasculo aptiore feruidum intra tibias collocetur, in quod subinde igniti silices immittentur, ut nouus copiosiorq; denuo excitetur halitus, qui semper in uentre tumido quàm fieri potest calidissime excipiat: ne tamen primi semper feruoris uiolentia urat, cauendum sedulo. Quo autem constantius diutiusq; hoc sudoris effluuium tolerauerit ægrotus, eo suæ ualeitudini consulere rectius. Postea hic linteo calido coopertus; in contiguum lectum calentem deponetur, ne præpediatur sudoris fluxus. Interim quod roboret, uel uires reficiat, siue sit conserua, seu zinziber Indicum conditum, uel cōfectio in rotulis, aut aqua cinamomi, uel aromaticum uinum, exhibeatur. Decocti iam dicti materia esto: radices & folia sambuciatq; bulbuli, raphanus, absinthium, pulegium, ruta, abrotanum, marrubium, hædera, rosmarinus, maiorana, origanum, saluia, calamentum, lauri folia, thymus, isopus, centaurium minus, nasturtij species, baccæ iuniperi, anethum, chamæmelum: quæ admixtis sulphure potissimum & sale, in lixiuio & uino, aut in lixiuio solo bulliant. Vel suffitus hic ita excitetur,

solo acri lixiuio ex sarmentorum cineribus uel quer-
 cinis parato.

In Hyposarca uerò, cum multa utilitate etiam in
 ignitos lapides maximè pyrites infundi acetum ob-
 seruaui, cuius uapor feruidus eodem modo in cupa
 excipitur.

Vbi balnearum naturâ calidorum fuerit copia, li-
 cet quædam utilia sunt, uelut salsum, nitrosum atq;
 etiam aluminosum : sulphureum tamen præfe-
 rendum.

Iuuabit item sudoris expulsionem, si dictarū her-
 barum & radicum pars in iisdem liquoribus ferue-
 at, additis aristolochia rotunda, baccis lauri, iunipe-
 ri, radice iridis: atq; immersis in decocto amplissi-
 mis spongijs, uel pluribus simul confutis, & expres-
 sis, aut panno denso duplicato similiter imbuto ex-
 tortoq; aliquoties calidissimè & diutissimè fouea-
 tur fatigetur, & que totus uenter, dempta hepatis re-
 gione.

Inde adhiberi queunt partim liquores & olea an-
 tè dicta, partim etiam alia, item unguenta, emplastra
 & cataplasmata: cuiusmodi sunt, oleum iuniperinū,
 irinum, è lateribus: unguēta, Martiatum, Agrippæ,
 Aragonis: emplastrū semel dictum de baccis lauri:
 cataplasmata ex farina fabacea, lupinorum, stercori-
 bus caprinis, columbinis, uaccinis recentibus & cali-
 dis, caricis, baccis lauri, aristolochia rotunda, staphi-
 de agria, pyrethro, cardamomo, radice iridis & sul-
 phure adornata. Vel si post inunctionem gratio-

res fuerint sacculi ex lino raro, tenui, trito, & materia bis seorsum enarrata cōpositi: deinde scripti proximè decocti, uel lixiuū, aut uini halitu (ut dixi) irrigati, calefacti, nō debent non esse admodū utiles.

Tumores insuper tibiārum discutit, pulmentum ex medulla panis, cum muria aut lixiuio coctum; admixto postea oleo irino, siue alio simili.

Porro quia extremi morbi extrema plerunq; remedia postulant: quæ hic quoque in actionibus chirurgicis obseruasse me memini, colophonis uice subiungam. Præter communem uero aquæ extractionem in Ascite, paracētēsi uel pertusione ad musculum obliquum ascendentem, eam feliciter, quam rarissimè, educi per umbilicum uidi: natura hinc detrahendum commonstrante, ob singularem & notabilem umbilici tumorē. Curæ autem cumprimis sit, ut exiguo admodum foramine is aperiat, ne profluuiū confertim subsequatur copiosum nimis: quotidie enim circiter libras duas effluxisse satis est. quare illud tenaci emplastro mox occludendum erit, ne ex præcipiti & nimia humoris simul & spiritus effusione, effluat quoq; uita. Vbi etiam remoratur, subsistit, impediturq; intus liquor serosus, siphone leuiter altiusq; immisso facile fluet. Cæterum toto huius curationis tempore, quanto poteris studio, uiscerum robori consulendum medicamentis, uictu delecto, & condituris analepticis. Ea enim nisi restaurentur, quacuncq; symptomatum ablatione operam ludes: rarus siquidem eiusmodi curatio-

Aquæ extractio per umbilicum.

num est successus felix, etiam si nulla in re deliqueris, quod eæ nec admittantur nec tententur, nisi quando extremè desperatum est. Suum hic meretur lo-
De locis in cum elegans Hippocratis sententia: Vbi, inquit, æ-
homine. ger ex ijs quæ aquam purgant, non leuior fiat, inu-
 rendæ sunt crustæ quàm tenuissimæ, & quàm maxi-
 mē in superficie, quò aquam continere possis circū-
 circa umbilicū, & unā in umbilico, & emittere sin-
 gulis diebus. Quum enim morbus sit periculosissi-
 mus, in his periclitari oportet. Si enim successerit, sa-
 num facies: sin minus, quod etiam aliàs futurū erat,
 id ipsum perpetitur.

*Aquæ edu-
 ctio è pe-
 de, et supra
 talum.*

Fœlicem præterea curationem in aquæ cutem
 subeuntis educatione non semel uidi, maximè in hy-
 posarca, ubi super utroq; pede tumido instar incisæ
 uenæ, uel paulo' altius, fissuræ scalpello uel lanceola
 infligerentur. Enimuero die noctuq; ex ijs uulnu-
 sculis ingens aquæ copia citra uirium læsionem in-
 desinenter extillat, quod parum simul spiritus pe-
 creat. uerū ex cōtinuo falsi humoris ad exigua uul-
 nuscula decubitu, quandoque suboritur erisipelas:
 quo tamen uicto, rursus nonnunquam eodem mo-
 do idem pedum tumor finditur. Proinde nō imme-
 rito omnibus prædictis efficacius auxiliū in Anasar-
 ca, uel Hyposarca, siue Sarcite aut Leucophlegma-
 tia chirurgiam præstare, asserit Asclepiades. Fissu-
 ras autem circa internum talum infligi uult in loco,
 quatuor digitorum spacio supra talum eminēte, ea
 profunditate, qua in uenæ sectione quis utit. No-

*Actius lib.
 10. cap. 30.*

ui, qui ex inflatis tibijs aquifolia cæsis, aqua cōtinuò emanante liberarentur. Leonides etiā alias corporis partes scalpello incidi uult, si tardius supra talos extillet aqua: ueluti scrotum tumefactū, pudenda, femora, locos supra manuum iuncturas. Hippocrates scrotum & femora uulnusculis solūm lacinat, eaq; sale cōfricat: cuius subsidium hīc postea ostendit usus. Scrotum in eiusmodi casu quandoque subtus acu uulnusculis duobus factis pertunditur: filoq; simul traiecto & relicto, stillat sedulo hic humor. Refert Antonius Beniuenius, mulierem hydropicā ex alto loco in terram decidisse casu, quā nulla uitæ spes superesset, uterōq; ad lapidem eliso & disiecto, omnem effluxisse aquam, & pauco post tempore idoneis præsidijs fuisse ualeitudini pristinae restitutam.

*De abdite
morb. caus.
cap. 109.*

¶ Siccantem, calefacientem, & facili cōcoctionis uictum esse oportet. Alij usus esto frequens, maxime tenuioris fortunæ hominibus.

DE LEVCOPHLEGMATIA A CERE

*) bri fluxione orta, Hippocratis sententia, lib. de Locis
in homine.*

QVum retrò ad uertebras, & in carnes defluerit, hydrops fit: id quod ex hoc cognoscere datur. Siccae enim anteriores partes sunt, caput uidelicet, & nares, & oculi. oculis amplius hebetudo accedit, fiuntq; cum uirore pallidi, identidem & reliquum corpus: ac nihil expuit homo, etiamsi multū fluat. Fluxus enim per mediam carnem retrò decur-

bens, & ab anteriore auersus, anteriores partes siccas reddit: posteriorum uero carnē irrigat, & magis eam quæ intus est ad uentrem, quàm quæ foris est ad nasum, &c. & post: Intus uero foramina ampliora sunt, & intermedia tenuiora habet: fluxus autem, utpote ab altioribus procedens, & tenuia impedimenta contra se habens, influit, & carnes humiditate implet. Sed & humiditas à cibus in idem procedens corrumpitur: corrupta autem ipsa præ admixtione, & simul cū ipsa ea quæ à capite defluit, corpus nutriunt. Carnes uero multo humore nutritæ, & morbofo augescences hydropc plenæ fiunt.

IN FOEDA MORBOSI CORPORIS constitutione, ubi oculum foueri elephantiasin suspicio erat; huius nostri præscripti obseruatione curatus est nuper ager homoplebeius.

SECTA primū cubiti uena communi, sequentem quotidie hausit potum hora matutina.

R. Rad. polypodij ꝑ i. s.

lapath. acuti integri
cicorij cum radic.
summit. lupuli an. m. i.

scabiosæ
ueronicæ
fumiterræ an. m. ij.

fl. borraginis
buglossæ an. m. s.

liquiritiæ

liquiritiæ rasæ ℥ s.

passul. enucleat. ℥ i s.

Coquantur in aquæ riui lb iiii, donec absumentur medietas, admiscendo in fine decoctionis senæ Alexandr. mundatæ ℥ ij. epithymi ℥ i. nocte relinquantur in infusione, & à ualida expressione adde syr. de succo fumarie ℥ iiii. fiat potus.

Postea hoc usus fuit balneo frequenter:

℞. Scabiosæ, ueronicæ, fumarie, lapathi acuti integri, furfurum triticeorum an m. iiii. maluæ m. v. in cacabo aquæ bulliāt, ad balneum. Deinde se eo inunxit linimento:

℞. Succis scabiosæ,

ueronicæ,

fumarie,

lapathi acuti. an. ℥ ij.

aristologiæ rotundæ,

uitrioli Romani an. ℥ ij. s.

sal. nitri ℥ i.

lithargyr. argent. ℥ iij.

aluminis ℥ ij.

fulphuris ℥ s.

olei laurini,

axungie porc. an. ℥ ij.

oleum & axungia cum succis coquantur ad eorum consumptionem, inde misceantur reliqua ad linimenti formam.

Brachijs & fœmoribus affigatur cucurbitæ cum scarificatione.

Cauit à multū salſis, fumo induratis, lacte, crebro caſei uſu, cereuiſia recenti, turbida & acida, uino rubro, ab iſs quæ diutius in aceto fuere aſſeruata, denique ab omni intemperantia in uictu, atq; animi affectibus.

DE CARCINOMATE SINISTRI TESTICULI.

ob emollientium & reſoluentium medicamentorum uſum exulcerato, ac in cancerum immedicabilem conuerſo.



NOBILISSIMVS & magnificus uir N. annos 28 natus, conſtitutione gracilis, temperamento bilioſus, ſtatim à duodecimo ætatis ſuæ anno, & frequenti Veneris conſuetudine utebatur, & inordinato aſſiduæ equitationis exercitio corpus exagitabat: quæ duo tum meatuum relaxatione, tum debilitationis interuentu diſpoſuere membra genitalia ad ſuſcipiendos deſluxionum imperus à partium ſuperiorū conſultatione: ueluti etiam capitis, quod acuminati uerticis reſpectu continug deſtillationi adeo erat obnoxium, ut præter ingruentes quaſdam arthritidis minitationes, ueretur, ne materiæ ad pulmones deſapſus, aliquando tandem induceret inſanabilem tabidæ luis contagionem. Huic uero apparatui materiæ ſuppeditat praua uictus obſeruatio, quæ maxime propter patrium (hoc eſt, Germanicum) compositionum morem ſanguineæ moli cōmunicauit ſummam humorum corruptionem & adaffationem, quam forſitan auxerunt reliquæ labis Neapolitanæ malæ

male curatæ, cuius insignijs aliàs quoq; ornabatur ad lasciuæ iuuentutis imitationem. Ex eo occasionū confluxu incurrit progressu temporis, intercedente tamen hernia uaricosa, in sinistri scroti tumorem, quem primum quidem uulgaris chirurgi studio, cataplasmatibus discussum iri sperabat: at indies malo ingrauescente, me citari iussit. qui præuio loci affectu intuitu, ilico meam de Sarcocoeles præsentia sententiam, adstante chirurgo pronunciaui: & hanc eo usque progressam, ut nulla rerum applicatione resolui aut discuti posset: atq; operam lufuros, quotquot in eum finem aliquid tentarent. Hoc tamen suasi, ut contentus ad septimanas aliquot, sola incrementi eius mali prohibitione, per applicationem illorum quæ leuiter refrigerando exiccarēt, aquæ plantaginis incocta, & uictus legis studiosa obseruatione: ut nimirum à uehementiori equitatione, insolescentium succussantiumq; equorum usu, continua Veneris exercitatione, & poculorum certamine desisteret. si tamen interea temporis tumorem increfcere animaduertetur, posse tuta illius tumidi testis ablatione malum prorsus tolli, maxime si uictus & reliquarum necessariarū obseruatione comitaretur obedientia. Ille neglecto cōsilio in rerum non naturalium delicto, & naturalium transgressione persistens, ferocemq; equestris concussionis tumultationē commodæ sessori curruli præponens, in consueta uitæ libertate perseuerabat. Pertæsus tamen ualitudinaria cōditionis, tradit sese in potestationē chirurgi, cu

ius mira in similis casus profligatione felicitas prædicabatur: qui præstita opere pollicitatione, applicuit cataplasma sibi πολύχενσον, ex multa emollientium & resoluentium farragine cōgestum: quo haud obscure ostentauit ignorationem suam circa & medicamentorum usum, & ægritudinis essentiam. Hinc ueriorum hominum consilia sequutus æger, topica experitur multiplicia, partim emolliētia, partim discutientia & resoluētia pulmenta, cataplasmata, unguēta, linimēta, cerata. Hac ratione eò promotū est post paucorum mensium curriculum, ut supra testem leue tuberculum rubore aliquo tinctum apparere cœperit, quod à chirurgo pertundebatur: immissoq; specillo ad scrotum usq; id identidem aperiebatur: nihilq; effluxit, ac tentæ immisse extractæq; nullū latentis in eò tumore duro humoris indicium monstrabant. Quare ijs quæ mollirent, putrefacerent, ac pus generarēt perseveratum est, donec proferperet, sc̄q; ostentaret latens cancer, rerum dictarum applicatione promotus, irritatusq; qui deinde eo in loco putredini usq; adeo obnoxio, furore tanto breui efferbuit, ut ater teterrimo cum foetore & frequenti sanguinis fluxu, tumoris multam partem depasceretur, exederetq; miserabilem in modum.

Sic tandem cruciatus incredibilis continuatione, & foetida putredinis exhalatione uictus, animā cum magna sui ipsius abnegatione libenter Deo reddidit, commēdauitq; in Ianuario anni sexagesimi quinti supra sesquimillesimum. Ante mortem, quum

ex Illustrissimi principis nostri ministerio ad meam familiā reuersus, ab agroto uocarer, mox cum multo luctu exclamabat, Vtinā tuo obsequutus fuissē consilio. Nec aliō huius narrationis institutum quis torqueat, quā ut in similis uitij ambiguitate, prouidē magis consilij ratio perpendatur. Nam ab

*A' molliē
tibus irrita
tur cancer.*

DE UTERO CLAUSO.



QUAE à me in pudendi clausi curatione aliquoties diligenti animaduersione obseruata sunt, paucis explicare statui: ne & hoc arcanum, mortaliū utilitati subtrahisse, mihi que peculiariter reseruasse, sepelijs scēq; uidear. Hic primum supino ferē decubitu soli uel aeri lucido exponatur uirgo, in mensae sublimitatē erecta, collocataq; retractis diductisq; cruribus: inde, in qua ceruicis uteri parte connatum sit impedimentum, & quale id existat, solerti studio perquirendū. Quibusdam etenim obsepta est pars anterior, sublimiorq; alijs media: nonnullis os uteri profundius: sicq; id uel membrana nervosa crassa dura, uel innata carne pauca uel multa. Differentia uero uel oculi inspectione ex membranæ candore, & carnis rubore, quemadmodum & indicis digiti extremitate ex renitentia modo dijudicatur, potissimum partibus his speculo incuruo ad trianguli formam adornato,

*Incidenda
ceruicis u-
teri modus.*

nato, artificiosè dilatatis, quandoq; etiam anhelitu fortiter retento. Ut autem in operis instituti executione minus impediariis, tibijs ita ad coxas reflexis distensisq; manus inuersas utrinque per posteriorem partē introrsum alligabis: hoc modo sectionem citra ullius etiam adminiculum perficere poteris. Apud eordatiores tamen, nec usque adeo pusillanimes, citra ligaturæ usum retentis genibus à confirmationis animi matronis, id operis felici successu per diuini fauoris gratiam absolui. Sed nouacula opus est acuta, & circumquaq; linteolo obligata, debita cuspidis parte libera, ne altius quàm postulet necessitas, penetres, maxime si profundius secandum sit. Ea usus sum quandoque ancipiti, sed cum maiori cautione: plerunque superiori eius latere obtuso, propter maiorem securitatem, ne uesicæ collum laceraretur. Minori etenim periculo aberrat deorsum ad intestini recti crassitiem, quàm ad colli uesicæ tenuiorem consistentiã: utrobique tamen noxam facile prouida animaduersione declinabit is, qui in hoc negotio fuerit exercitatus. Lancetam quoq; uulgarem hic minimè admitto, potissimum in duris nervosæ crassicie (quales ferè sunt omnes) membranæ, quarum sectione ob duritiem reiterata, mihi aures ex sono nō nihil crepitante radi meminerim. Harum tamen incisio, quàm carnis innatæ, faciliior est, maxime si ex sublimius affigantur: & promptior multo, si in ijs sanguinis menstrui quandoq; introrsum erumpentis, easq; distendentis, colluuiæ decubant.

bat. Siquidem in hoc affectu ferme nunquam medicopera prius requiritur, quàm quum uel huius sanguinis extra uenas residentis effluxio ab hoc sepius impeditur: uel ubi in congressu meatus uiro fuerit preclusus. Vtriusque casus foeminas à me fideliter curatas, etiamnum superstites esse arbitror.

In operis huius administratione nouaculā imprimēs, secabisque figura ad naturalis hiatus dimensionem ducta à uesicæ collo deorsum, iusto utrinque interstitio relicto, quod leuius securiusque in operiente membrana, & potissimum humoris affluxu tensa effeceris. In adnatæ uero carnis incisione, repetenda aliquoties sectio, ob sanguinis profusionem: quem immissa spongiola, prius in aquam tepidam intincta, expressaque, elues. Curandum autem summo opere, ut non oblique collimes, sed rectitudinem in diuidendis huius carnei isthmi angustijs serues, maxime si altius secandum sit. Ab ea minus aberrabis, si tridens illud speculum incuruum altius immiseris: quod etiam commodius inferet decumbens uirgo uel matrona, uersatili per spiras aciculo supra uentrem sursum innixo: quam eidem quoque, si uolet, uertere ad iustam expansionem licebit: sic uesicæ ceruicem reprimet dens speculi superior, ut à sectione tutior ea maneat, dum dentes reliqui latera distendent, inter distortos hos tu opus prosequeris. Si uero suspecta tibi fuerit carnis innatæ profunditas, per uulnus aliquatenus sectum, uiolenter intrudito recta specillum tenue, quod nodulum in extremita-

te rotundum habet: eoq; totam carnem perrumpe,
donec penetraueris, si possis: nam ob specilli rotun-
dam extremitatem, ubi ad sinum perueneris, uel in
matricis osculum impegeris uiolenta perruptione,
non delinques: quod specilli hastati impressione nō
tam securē feceris. Carnis totius profunditatem
hoc modo semel pertusam, specilli immissi subsidio
deinde facilius secare poteris. Ego tamen angustū
foramen specillo obtuso factum, alijs similibus in-
strumentis crassioribus prosequutus, eatenus per-
rupi, donec forcipem antrorsum oblongā ualidam-
que per eandem hanc fissuram transmittere ualerē:
inde manubriolum utrinque rotundum manibus
uiolētis simul sursum ac deorsum uno tractu distra-
hebam, donec dilaceraret innata caro uniuersa. Inci-
sio etenim & laceratio artificiosa hic suum habent
locum. Proinde & digiti indicis extremitatem in
distractionem quandoque adhibemus, maximē ubi
ob loci aperiendi angustiam uel profunditatem, er-
rorem inter secandum ueremur. Sectio item obli-
quē uel transuersē, uel ad crucis formam duabus li-
neis inter sese transuersis administrari poterit.
Membranas & cōnatam carnem si quis uolSELLA ap-
prehendere rescareq; uolet, id quoq; tuto fecerit:
quanquam utriusq; curationem etiam sine multa ea-
rum excisione absoluerim, potissimum si post inci-
sionem fissura indicis, uel ferrei instrumenti admini-
culo aliquoties dilatetur. Postea enim usque adeo
contrahuntur corruganturq; membranosa uel car-

neæ partes relictæ, ut nec concubitus nec partum remorentur. In coniugatis uero si membrana fuerit incisa, nec sequuta insignis hæmorrhagia ex uteri uenis menstruis, quæ alioqui in claudentem membrana quandoq; decumbens, sectioni ansam subministrare assolet: Venus moderata, lentaq; nec uiolenta aut uehemens, post triduum concedetur. In dissecta autem carne profunda ceruicis uteri, nocte octaua post incisionem, eiusmodi actionem permisisse me successu læto hora matutina, silentio sepeliendum non putauit.

Caterum antequam hoc opus in findenda carne aggrediaris, puluere sanguinis profluuium inhibente ex bolo armeno, sanguine draconis, & oui albumine, uel id genus alijs restringentibus, te instructum esse oportet: licet ijs nunquã usus fuerim, nec leuem compescuerim fluxionem, quanquam altero etiam die adhuc sanguinis satis proflueret, eo quod cõstarent uires: decubitus tamen & quietẽ, donec is prorsus consisteret, imperabam. In sanguinis etenim defluuij habenda uiriũ singularis ratio, ne uel labefactẽ cordis robur: uel syncope aut spasmus, aut aliud symptoma grauius consequat. Ex membrana uero exanguis pertusione, nihil de sanguinis fluxu timendum, quem connatę carnis uenæ uel stilant, uel fundunt. Ab incisione si quę fuerit obuia sanguinis ex uteri uenis antea expulsi, uelut menstrui uel cuiusuis alterius humoris colluies, ea statim prius aqua hordei tepida syringe iniecta, dein-

de cum hydromelite identidē sæpius eluenda. Quicquid autem iniicitur, infunditur uel inseritur, tepidum esse oportet. Interim inspicienda est aliquoties fissura, siue speculo siue forcipe dilatanda, uel gentianæ radicis immisione: uel certius spongiæ, quæ ceram liquefactam imbibet, & mox, ne comburatur, extracta fuerit, præloq; ualidè expressa, unde turunda longa crassaq; pro rei præsentis necessitate excidetur, illinenda aut abstergente aut exiccante, reprimente, & cicatricem inducente medicamento, pro uulneris cōstitutione. Enimuero huc studium omne conuerti oportet, ut à carnis, non item membranæ incisione, conglutinationē quibuscunq; ualueris modis impediās: tam hæc pars rursum promptè coalescit, atq; huc omnino propendet natura. Quapropter ubi cutē obduci uoles, post dies pauculos, tubulus argenteus uel plumbeus, cauus, læuis, oblongus, cum foramine unico maiore antrorsum, cum multis uero minoribus in circumferentia, ne sanici effluxio impediatur, ab aurifabro confectus, inseretur, maxime ubi profundius fuerit uulnus: tubuli autem pars posterior non nihil inclinabit cum obtusa extremitate, utrinque duobus locis pertundenda: unde fila duo fortia dependebunt, ut quum in sectam rimam tubulus fuerit intrusus, anterioris pudendi angustijs & osse sacro intercludatur, retineaturq; nec mulieris incessum aut deambulationem præpediat: & quando uoles, aut postulet necessitas, filis extrà pendulis hic confestim retrahi queat.

Tubulo

Tubulorum forma esto diuersa, pro fissuræ modo & altitudine. Nupta, maritiq; iam congressum innoxium experta, in frequentiori huius repetitione moderata, eidem morem gerat.

Porro quoscunq; cordatos hic præmonitos uolo, non quemuis ad huius curationis administrationem temerè admittendum esse: sed quacunq; diligentia prius inquirendum, quoad fieri potest, huius sectionis peritum uel medicum, uel chirurgū, uel obstetricem: ut quæ ex sinistra curationis errore consequuntur perniciofa symptomata, prouidentiq; subsidio declinentur.

Hoc ceruicis uteri uitium Albucasis, inter Arabes chirurgus minimè poenitendus, Alraticam nuncupat: Clausura, apud Auicennam redditur. Eius meminit etiam Cornelius Celsus. Malo hoc affectu, Græcis dicuntur ἀπὸ τῆς ἀλῆς, id est, imperforatæ.

Cæterum ut penitus intelligatur, quibus in eiusmodi curatione usus fuerim organis, horum icones & formam in Reipubl. utilitatem subiungere uolui.

Lib. 2. cap.

72.

Alraticam.

Clausura.


Lib. 2. sen

21. tract. 4.

cap. 1. Lib.

7. cap. 28.

IOAN. VVIERI
Speculum incuruum.



IN his meis Obseruationibus, propter argumēti
affinitatem, medicos obiter uolui admonitos, ex-
tremi-*mitatem* colli uesicae exteriorē non eodem in
cunctis foeminis loco apparere. Enimuero pluri-
bus ea supra ceruicis uteri angustias exteriores, sub
nympha conspicitur: paucis introsum in superiori
parte pudendi latet: quare huius dilatatione opus
est, si quid in eam immittendum quacunque occasio-
ne fuerit. Eius uero meatum collumque integrum us-
que in uesicam eatenus organo dilatante commodo
extendi posse, ut magnum digitum non difficulter
intro admittat, meminisse operae precium est: si for-
tassis huc calculum impingere, uel alius necessitatis
occasionem requirere tantam dilatationem con-
tingat.

DE HYMENE.

OB dictos ostij matricis affectus, eadem opera
meam de hymene sententiam paucis annecte-
re placuit, aduersus multorum etiam insignium me-
dicorum cōceptam semel opinionem, quasi eo non
omnes muniantur uirgines. Diuersum autē a me asse-
ritur, eo nimirum uniuersum puellarum genus ab i-
nitio dotatum esse, nulla excepta: atque hunc uirgini-
tatis existere custodem, claustrum & munimentum.
Eum Arabes nouēre, ut Auicenna lib. 3. fen. 21. tract.
1. cap. 1. item Almāfor. Habuisse item eius noticiam
Cornelium Celsum, inde colligo, quod in calculi foe-
minarum

minarum exectione, uirgini digitos subijci uult tanquam masculo (hoc est, per anum, ob hymenis uidelicet interpositum & pudendi ostium contractius) mulieri uero, per naturalia. Ex neoteris, hunc admiserunt Alexander Benedictus, & cum eo alij numero pauci. ANDREAS VBSALIVS, qui principem facile locum in dissectionis exercitio obtinet, etsi in doctissimis suis de Humani corporis fabrica commentarijs, hymenis leuiter ex Arabum sententia in priori editione meminisset solum, quod nullas aut raras admodum secuisset uirgines: tamen postea in libello de radicis Chynæ usu, hunc ex frequentiori obseruatione diligenter describit, ijs uerbis: In uteri ceruice puellis, mox post ingressum colli uesticæ, in superiorem muliebris sinus partem, septum quoddam occurrit transuersum, carnea cuticulariq; constans substantia: illi prorsus simili, qua nymphæam efformari cernimus. Septum hoc ceruicis uteri lateribus sua crassitudine est adnatum, paulo in connexu quam reliqua amplitudine crassius, quamuis interim membranæ crassitiem non multum superet. In medio septi foramen occurrit longa sectione pudendi modo dissectum, adeo ut menstruas purgationes in uirginibus non retineat: neq; opus sit confingere uenas aliquas hoc septo seu hymenæo inferiores, e quibus menstruus sanguis uirginibus promanaret: aut quæ ab illis distingui debeant, quæ mulierum menses alioquin dimittunt, discrimine interpretantes & utero non gerentes subaudito. In
secunda

secunda autem editione suorum Anatomicorum librorum, copiosius de Hymene differit. Nec minus exacte in suis Observationib. Anatomicis hanc uirginitatis zonam depingit celeberrimus in hoc artificio GABRIEL FALLOPIVS, ad hunc modum: Aliud etiam notandum in hoc sinu mulierum est, quod Anatomici aliquot reperiuntur, illos deridentes, qui hymena ibi collocant. Verum mea sententia non sunt ira deridendi: quoniam reuera tu uideri poteris in uirginibus membranam quandam nerveam, non autem carneam, quæ immediate post *ovēphay* (ita enim Græci uocant canalem, per quem mingunt foeminae, uel rectius collum ipsius uesicæ) adit, & claudit sinum per transversum. Attamen non est integra hæc membrana, sed in medio perforata, ut minimus digitus manus suo apice in adultis facile ingredi possit: hocq; uirginale claustrum est, ac per foramen ipsius facillime egrediuntur menses.

Hoc noluit Soranus esse membraneum: sed potius esse ipsius sinus muliebris angustias, factas ex quibusdam rugis collectis, quæ a uasis ex utero illuc prodeuntibus contrahuntur: cumq; hæ dictæ rugæ extenduntur in stupratis uirginibus, atque dum uasa dicta disrumpuntur, dolorem pariunt, & sanguinem (ueluti si inactata esset uictima) effundunt.

Pace tamen ego tanti uiri dixerim, quod mihi potius uidetur membrana non admodum crassa, atq; in medio annuli modo perforata, quæ postea lacera

n cutit,

cutit, & tandem (ueluti in uiris fit, dum laceratur glandis frenum) euanescit. Hactenus ille. Hisce Carpi, & quorundam Anatomicorum sententia stabilitur. Claustrum id cognouit & author carminis uulgo triti:

Est magnum crimen, perrumpere uirginis hymen.

Existit autem in alijs membrana hæc tenuior, fragiliorq; in plerisque tam solida, crassa & firma, ut sectione opus sit. Ea tamen interdum à mariti ualidi insultu frequenti, etiam post menses aliquot pertunditur: qui si quandoq; segnior aut impotentior fuerit, chirurgi adminiculo erit iuuandus. Dum uero ea tenacior seduli initus uiolentia impetitur, fatigaturq;, intumescit plerunque usque adeo cum annexis particulis, ut penem amplius non admittat, præcludatq; uiro accessum omnem, nisi incisa. Hæc exemplis mihi notissimis facile demonstrauero.

Hymena præterea nouit diuinus ille legislator Moses, promulgato ex Dei uoluntate eiusmodi edicto Deuteronomio. 22. ubi indiciorum uirginalium meminit: Si duxerit uir uxorem, accesseritq; ad eam, & odisse eam coeperit, quæsieritq; diuortij occasiones, nomen pessimum ei obijciens, & dixerit: Vxorem hanc duxi, & ingressus ad eam, non inueni uirginem, uel uirginitatis signa: tollent eam pater & mater eius, & proferent signa uirginitatis puellæ ad seniores ciuitatis, qui sunt in porta. dicetq; pater: Filiam meam dedi huic uxorem, quam quia odit, imponit ei nomen pessimum, ut dicat, Non inueni tuam filiam uirginem:

uirginē: & ecce hæc sunt signa uirginitatis filie meę. Expandent uestimentum coram senioribus ciuitatis, apprehendentque senes urbis illius uirum, &c. Quod si uerum est uerbum illud, & signa uirginitatis in puella non fuerint inuenta, ducent puellam ad ostium domus patris sui, obruentque eam ciues illius ciuitatis lapidibus, ut moriatur. Hucusque Moses.

Ex hymene, eiusque usu intellecto, non difficulter hic locus explicabitur. Enimvero in matrimonium traditis uirginibus, in primo congressu ex huius mēbranae uiolenter ruptæ uenulis profluit sanguis: cuius licturis, uti uirginitatis uel uirginalium notarum argumentis, testibusque, tincta quibus hætegentur uel incumbunt linteamina, coram magistratu, suspiciosi, coniugesque uiolatae antea pudoris zone falso insimulantibus maritis expandi, palamque ostendi iubet Moses.

Ex historia item memorabili à me conscripta lib. 2. de Præstigijs dæmonum, è Suida, in explicatione nominis I E S V, de perpetua uirginitate diuę Virginis, hoc castitatis munimento quascunque uerè puellas esse donatas, euidentissimum est. Quemadmodum & ex Cypriani epistola 11. ubi agit de uirginib. Deo dicatis, quæ cum uiris cōgressæ fuerint, scribit sexum foemineū esse infirmū: hinc subiūgit. Inspiciantur uirgines ab obstetricib. diligenter: & si uirgines inuentæ fuerint, accepta cōmunicatione, ad Ecclesiam admittant, &c. Si autem de ijs aliquæ corruptæ fuerint deprehensæ, agant poenitentiam plenam.

Africanis & Barbaris hoc quoque uirginalium ornamentum tam innotuit, ut in nuptiarum solennibus, certis de causis celebre habeatur.

Cæterum, Nigrorum uiri huic fragili sepimento minus fisci, ualidioribus certioribusq; præsidij filiarum uirginalia muniunt. Hi etenim (authore Petro Bembo lib. 6. historiæ Venetę, ubi de Lusitanorum nauigatione loquitur) & boni homines, & strenui bellatores, filiabus suis, ubi primum natæ sunt, pudenda consuunt, sic tamen, ut urinæ meatus non impediatur. Illæ autem ubi adoleuerint, sic consueta nuptum dantur: sed primum ea sponso relinquitur incumbitq; cura, ut ferro conglutinata ceruicis uteri labra secet, diuidatq;. Tanto est in honore apud homines illos barbarissimos, in coniuge ducenda, uirginitatis certitudo. Is si innotuisset illud linimentum Paracelsi, quod oris hiatui illitum, momento id (si dijs placet) contrahere conglutinaréq; posset (quemadmodum ex eius affectis quidam non indoctus nuper, lingua nimis petulantij, ne dicam mēdaci, effutire, iactareq; suo more est ausus, ita à suis doctis magistris) acu, filo, & dolorificis puncturis: in consuendo hoc meatu, opus fuisset minimè.

COLLI MATRICIS PHYMÆ

eiusq; Curatio.

IN hoc affectuum colli matricis catalogo, recensetur quoq; phyma, siue tuberculum quoddam oblongum in ijs angustijis enatum: quo quum nobilis & generosa Domina usque adeo afficeretur, ut e-

ius

ius impedimento difficilior redderetur marito ini-
tus: malo hoc clàm detecto, consilium ob coniugis
molestiam cum pudore rogat. Ego auferendum cen-
sui. at ad eius inspectionem non admissus, sciscita-
tus uerò num digitis id comprehēdi posset? illa an-
nuit: Vt itaq; sibi sericei duplicati, ceraq; firmati, uin-
culo ad radicem id constringeret, indiesq; arctius
contraheret, donec tandem filo prorsus constricto
abscissum decideret, suasi. Hæc dicto audiens, con-
siliūmq; foelici successu sequuta, indicauit postea, se
phyma illud eo modo ablatum secuisse, & lacteum
quiddam emanasse. Potest uinculum hoc sericeū
etiam efficacius reddi, si requirat necessitas, ut ni-
mirū antea horas aliquot in aqua sublimata uel for-
ti, ter aut quater maceretur, & exiccetur.

GANGRENÆ PVDENDI CVRATIO.

GAngrenam adhæc in uteri ostio grauissimam
foetidissimamq; in nobili matrona iuuenē an-
norum uiginti quinque, superiori anno curauī. Ae-
stuante canicula tuberculum quoddam in eo sinu,
fortē ex uehementiori insultu mariti exortum, impe-
ritus rerum chirurgus in idonco cataplasmate, & ne-
scio quibus alijs admotis uincere conatus est: unde
intra dies non multos tanta scuitia efferbuit, ut eue-
stigio pars ea uniuersa putresceret, nigricaret, & in-
termoreretur: pestisq; hæc celeritate incredibili a-
num uersus sauiret, & sic simul partes anteriores
cum posticis letali clade perderet. Accedebat calor,
febris, extrema uirium debilitas, summa cordis an-

gustia, & reliqua symptomatum malignorum congeries, quæ profecto ex putidissimæ cloacæ halitu uix ferendo augeri oportuit. Horrenda erat cladis huius facies. Accitus ego in extrema rei desperatione, haud mora uberrimum solani & plantaginis succum primùm syringe in utrunq; meatum ter uel quater interdium injicio, deinde horis illis intermedijs lini hapsum ijs succis admixto aceto imbutum applicui: qui exuccus, eodem rursus permaduit liquore: ac eiusmodi repetita aliquoties applicatione perseveratum est, donec restingeretur feruor, & desineret putrefactio. Assumebat interim quoq; potionem singulis diebus ter ex decocto acetosæ, scabiosæ, pampinulæ, prunorum Damascenorum, summitatum borraginis, buglossæ, florum calendulæ, cum aqua saccharo & aceto ad syrupi acidi lōgi formam apparatus. Victus erat paucus, sed refrigerans & acidus, putredinis occasionem præscindens. Tercio die reuersus, incendij furiam sæuitiamq; putredinis remisisse comperi. Quare carnem nigram mortuamque exiguo forcipe attrahi, & cirunquaq; à uiuo firmè, sine doloris sensu separari resecariq; iubeo. Inde reliquum ad uiuum usque Ægyptiaco unguento absolvebatur: eodemq; modo ad cicatricis inductionem, uti in alijs ulceribus, progrediebamur. Atqui inter curandum erant aliquoties enemata ex hordei & aliorum aluum mollicientium decocto infundenda. Nec quæ cordi & uisceribus reliquis robur conciliarent, negligebantur: cuiusmodi sunt, ro-

sarum,

farum, florū borraginis, buglossæ, calthæ conseruæ,
idq; genus reliqua, atq; ea ratione conualuit breui.

Ad Gangrænæ huius curationē si alteram adiun-
xero, à me in Rolmanno Bilandio, uiro certè præ-
ter insignem eius nobilitatē optimo, peractam, non
uidebitur absolum. Huic propemodum septua-
genario, corpulento, cacochymicoq; à tertianæ fe-
bris afflictione subito quasi per crisim exoritur eris-
pelas phlegmonodes in sinistro brachio, quod ab
axilla ad carpum usq; cum dolore, rubore & dolo-
re plurimum intumuit: suppuratumq; breui, & à
chirurgo sectum, copiam saniei reddidit largam.
Vbi deinde citra intermissionem die noctuq; nihil
coctæ saniei, sed liquor serosus proflueret, cataplas-
ma ex farina hordeacea cum fabaceæ momento in
aqua decocta, uittellis ouorum & olei rosacei quan-
titate debita admixtis, applicui: unde mox aquei cru-
diq; humoris profluuium remittente, pus coctū pro-
manauit. Qua re animaduersa chirurgus, qui cum
mihī antea ob crudi illius succi effluxum ab eodem
laudatum controuersia fuit, materia magis exiccan-
te, dum abessem, consilij mei successum se sperabat
uicturum: linteisq; madefactis in uino cui incoctū
fuerat cuminū, uellit brachium uniuersum. Eo tan-
tum promouit, ut breui omnia uulnera, quæ supra
uiginti erant in uno illo brachio, absq; ullius saniei
guttula liuescerēt, & brachium deinde totum nigri-
care occiperet. Reuocatus, excandui cōspecta gan-
grænā: itaq; haud mora, altioribus uulnusculis bra-
chium

Erisipelas
phlegmo-
nodes

Gangræna
brachij.

chium scarifico, foueoq; spongijs utrinq; sibi correspondentibus ex lixiuio decoctionis farinæ lupinorum: deinde cataplasma ex farina hordeacea, fabacea, lupinorum & oxymelite apparatus admoveo. Atque horum usu continuo sanguis & spiritus reuocantur, pus redit coctum, naturalis reuiuiscit color, ulceribusq; melle rosaceo (cui plerunque admiscebatur uel puluis præcipitatus, uel unguentū Ægyptiacum) absterlis, curatur æger, & ad solita reuertitur munia.

Idem post annos quinque, quum à prandio feruente canicula ad miliare equitaret, febre denuo tertiana notha corripitur. Duodecimo autem die à morbo inchoato, corpore sic satis per aluum sponte exonerato, natura crissim moliebatur, sed imperfectam, ex caloris naturalis (ob corporis impuri molem, senium & morbum) defectu: sic humores putridos ad sinistram tibiam propulit, erisipelas ibidem excitatura. uerum præ sui impotētia in ipso opere subsistit, neque foras uersus cutim protrudere ualuit. Proinde euestigio post intensum dolorem, pauci tamen temporis, pars hæc grauata, obstructaq; interijt die decimotertio, perditō omni sensu, motu, calore, uiuidoq; colore, reliquis interim partib. corporis uelut illeſis: seminarium tamen hoc tam excreuit subito, ut quum ego uocatus, decimoquarto accederem, haud mora confirmatum esse σφάκελσιν pronunciarem: quem Aschachillos Arabes, Latini Sideratio.

Sphacelus.
Aschachillos.

Sideratio.
Ignis sancti
Anthonij.

rationem, uulgares Ignem sancti Anthonij, Chirur-

gi Ignem frigidum Germanica lingua nuncupant. *Ignis frigidus.*

Quare paucis cum eo horis commoratus, ob extinctam ea in parte uitam, totius porro corporis interitum in sene uale tudinario consequuturum prædixi, abijçq. Sectionis etenim occasionem præscidit ætas, afflicta uale tudo, familiæ splendor, & honor artis. Decimooctauo itaq; die in Domino obdormijt: cui locum in iustorum resurrectione precor.

Extremum pedem aliquando repente sphacelatum uidit Ioannes Fernelius, sine causa externa, sine tumore aut rubore conspicuo: oborto primùm dolore immanissimo, mox sensum in eo ac motum perijisse, partem totam liuore contabuisse, exulcerationem foedam insequutam, quæ acerrima causticaq; medicamēta sine sensu admitteret: non multo post arteriam brachij dextri, deinde etiam sinistri pulsare desijisse: ita sensim uniuerso corpore obsessio, miserum extingui, sine febre, sine symptomatibus admodum grauibus. Ad uenenatam qualitatem in omnes partes propagatam, quæ extremam perniciem hanc inferat, hic causam refert. *lib. 2. cap. 15. de abd. rer. caus.*

*CLAUSAE GLANDIS MAS-
scula curatio.*

AD clausarum partium tractationem pertinet glandis masculæ oclusus anterior meatus, quē in nobili adolescente Vuestphalo conspexi: qui lotum redditurus, acu longa & crassiuscula meatum aperiebat, coalescentem rursus paulatim exonerata urina. Huic affectui securè medeberis, altiori inci-

o sione

sione ab ora loci naturalis & consueti, usq; ad apertum uirge canalem: inde turundulam rotundam, cauam, tenuem, ex plumbo uel argento concinnatam inseres, prius tamen oleo rosaceo illitam; & postea linimento cicatricem inducente, uti diapompholigo cum pauxillo rosacei dissoluto, uel simili. In turundæ autem usu perdurabis, donec cuticula munitam esse urinae uiam senseris. Ea uero interim quandoq; mouebitur, ne in sanatione connascatur impedimentum. Si pellicula durior postea uidebitur, oleo amygdalarum dulcium, uel butyro insulso tepido introrsum illinatur aliquoties.

CLAVSI ANI CURATIO.

A Num item concreuisse infanti recenter nato, amemini; uestigio tamen exiguae fissuræ liquori transmittendo idoneæ relictæ. Hoc sepius mentum ad iustam naturalis hiatus diuisionem dissecabatur forficula; cuius inferiorem cuspidem per dictum foramen immittendam prius abrumpi, obtundiq; ne læderet acies, oportuit; deinde interpositis exiecantibus (uelut puluisculo rosarum, bedegaris, boli, cum aluminis usti momento) facile absoluipotuit curatio.

DE GLUTITARUM AC-

cularum curatio.

ROB A quædam foemina infantem curatura Dufeldorpij, in Martio anni sexagesimi quarti supra sesquimillesimum, a ciculas ore retentas duas, unam magnam, alteram minorem, arrepto infante quem inopinato in.

in ignem casurum uerebatur, fortè deglutit. Hærebant autem primùm aliquot horis in gula circiter palmam latam sub larynge, cum multo dolore & angustijs. Ad quam tandem accersitus, ut nihil cibi uel potus prius exhiberetur, quàm incurua forcipe exigua mox adferri iussa, tentassem num illæ retrahi possent, uetui. Vix ad teli iactum digressus, sorbitulunculam propinatam intelligo: qua in œsophagi partes inferiores, paululum supra uentriculi orificium deprimuntur. ubi nouo cruciatu pungit uoque dolore excitato, reuocatus iussi cereuisiā cum butyro & pane secalino, nostratib. cōsueto, crassiusque inciso hauriri affatim, atq; eam decubitu erecto somnum capere: siquidem nox erat. Hoc modo aciculas ad uentriculum deturbatum iri sperabam: quum eas infixas, uomitu has partes contrahente, firmissq; eo nisu impingente, tuto per fauces reddi posse non uiderem. Sic post noctis medium tertia hora, panis illius pondere depresso, in uentriculum resederunt. Inde eam secundo die iusculis pinguib. cereuisiāq; cum butyro ali, ac in dextra decumbere libero uentre, puluinaribus suppositis femori & brachio, ut minus impeditè ex stomacho per pilorum in intestina descenderent acus, iussi. A meridie surgentem, hinc inde inflectere corpus nolui, ne inæquali motu in intestinis alicubi infingerentur aciculæ: sed ut citra inflexionem erecta moderate inambularet, quo cum extremētis procliuius ad intestina magna siderent acus, consului: atq; ut deinde

exoneratæ primùm feces, in uase conseruariẽtur: qui
 bus postero mane depositis, apparuerunt aciculæ,
 qua dixi forma: longior uerò erat curuata nonnihil.
 Hæ eo quoq; fuere gratiores, quòd mulier hæc uel
 metus magnitudine, uel alia de causa, grauiter æ-
 grotare uideretur. Post dies uerò non mul-
 tos omnino conualuit.

OBSERVATIONVM IOANNIS VVIERI
VI RATIONVM FINIS.

ERRATA OPERARVM INCVRIA
commiffa, fic emendabis.

Pag. 14. Verf. 16. ferè & 27. Ingrauefcence 15. penult. leues 22.1. deleatur
alterum cum 36. 22. longiffimè & 23. fecus 24. exemplo 48. 15.
addere 59. 19. familiare 66. 2. a forti 77. 2. experi-
mentorū 96. 4. neotericis

REARVM ET VERBORVM PRAECIPVE

memorabilium INDEX.

Prior numerus paginam, posterior uersum
denotat.

- A**bscessus intra uētris mu-
sculos. 47. antepenult.
absinthij Santonici semen 71.10
acicularum deglutitarum cu-
ratio 106. 25
Actij locus 38. 8
agriois Hispanis quid 35. 25
Albucasis chirurgus 93. 13
Albus uicus Nabathæorū em-
porium 2. 3
allij usus in hydropis curatio-
ne 81. 18
alratica 93. 14
alui profluuium desperationis
præfagium 55. 2
Ambrosius magirus impostor.
47. 18
Anasarca curatio 71. 1
Andræ Vesalij de humani cor-
poris fabrica libri 96. 6 de
hymene sententia. *ibid.* in-
de. de radice Chyna. *ibid.* 12
anginæ pestilentes anni 1564.
& inde 50. 21. & 53. 11
ani clausi curatio 106. 13
anisi oleum 73. 19 electuariū 20
anni **M D L X I I I I** morbi, item
M D L X V. 50. 1 inde
anserini sterconis uis calorifica
23. 8. & 22. 24
antidotū contra pestem 50. 20
contra pleuritidem pestilen-
tiale 57. 16, inde.
contra quartanam 46. 19
D. Antonius episcopus Colo-
nienfis, quartanarius 47. 12
Antonij Beniuenij locus 81. 11
Antonij Houæi Zuermondij,
5. 2. eiusdem laus. *ibid.* 29
S. Antonij ignis 104. 30
apozema magistrale in hydro-
pe 68. 13
appetitus uehementia interdū
quartanam curari 45. 26
aquæeductio è pede, & supra
tatum 80. 15
aquarum uitiosarum usus no-
xius 13. 26
aquæ in Ascite per umbilicum
educendæ ratio 79. 12
aquæ insalubres quæ 28. 19
arana uia nucleo inclusa, &
collo appensa, supersticiosa
quartanæ curatio 45. 1
aranæ telæ noxia assumptio in
quartana 43. 23
aranæ telam albam collo ap-
pensam, quartanæ mederi
44. 24
aranei usus in quartana qualis
44. 15
arborum tabis causa 42. 9
ex Arthanite unguentum 70. 26
aschachillos 104. 28
Ascites curatio 65. 19
in Ascite aquam per umbilicū
educendæ ratio 79. 13
Asclepiadis, de aquæ in hydro-
pe edu-

INDEX.

pe educendæ ratione senten- tia	80.26	tum	106.5
<i>ἀντίπυρνα</i>	93.17	clausura	93.15
Auicennæ an cognitus Scorbu- ti morbus	10.16	cochleariæ herbę descriptio.	30.
		eius semen	31.1.
B		radix.	3
Balduini Ronsssei de magnis Hippocratis lienibus liber.	12.3	cochleariæ integræ forma.	32.
Barbarea, siue diuę Barbarę her- ba	36.12	eiusdem adolescentia & hy- berna folia.	33. & 34.1.
berros Hispanis quid	35.25	inde cochleariam non esse britanni- cam Plinij	34.25
bistortæ radix, britannicæ uir- tute similis	24. antepen.	utriusque discrimen	35.1
blauschuit	7.26	cochleariam non esse telephi- um	33.1.
brionis usus	70.11	quibus differat	34.1.
britanica herba, eiusq; usus	8.8	inde.	
britannica Plinij, diuersa à co- chlearia	34.25	cœlestis influxionis uariatio	
item Diosco- ridis britannica	27	morborum causa	49.16
brunkressen	35.25	contagio quomodo potissimū lædat	16.14.
busonis puluis in Ascite exhi- bitus	71.25	Cor. Celsi locus	11.23
C		cor ac uiscera confortantia quæ 102 penult. & inde	
Cachexia.	12.14	corpore uasto homines curple runque stolidiores	41.4.
uniuersalis	13.4	corpora diu extenuata non af- fatim reficienda	42.23
cancrum à mollientibus irrita- ri	87.7	corpora, diuersa proportionē augeri	43.10
cantharidum usus	72.5	coryledon, pro cochlearia.	30.
de Carcinomate sinistri testicu- li	84.6	inde	23.
cardamina, syfimbrium carda- mine	35.8	credulitatis etiam superstitione uis in morbis curandis	45.13
cardiaca palpitatio non sem- per imminentis mortis si- gnum	64.2	crescione, cresson	35.24
chamelææ uinum	70.8	crurum liturę & ulcera quomo- do fouenda	25.25
cicatricem inducens linimen-		cucumeris erratici succus	66.25
		cynanche letalis	51.18.
		inde	
		Cyprianilocus	99.23

INDEX

D

Dei erga genus humanum ele-
mentia 3.21. & 4.8
definitionum libertas medicis
permilla 7.14
Definitionum medicarum, Ga-
leni nomine editarum, locus
10.5
delirium desperationis præsa-
gium 35.4
diapôpholigis linimentū 06.5
Dioscoridis locus 44.13
Dodonęi in cochleariæ descric-
ptione lapsus 31.10
Dodonęi *ψευδοκρίσις* 36.10

E

Ebuli uirtus 67.5 inde. & 69 ult.
electuarij Indi maioris uirtus
71.5
elephantiasis curatio 81.17
epidemica lues qualis anno
MCCCXLVIII. item anno
MDLXV. 50.1. item 1564. ibid.
ex Equitationis concussione
noxa. 84. 15. & 85. 17 inde
crispelas phlegmonodes 103.8
excrementa etiam sua quada-
m ui naturali prædita 22.11

F

febris malignæ curatio 58.18
Fedronis Paracelsistæ calum-
niæ 48.12
flagitiorum frequentia, morbo
rumparens 3.8
è sicciculi feminib. oleū. 37. ult.
forcipis forma 24
D. Franciscus à Loë bis quarta-
na correptus 38.15

frangulæ usus 67.18
frictionum usus in hydrope 74. 21

G

Gabrielis Fallopij de hymene
sententia 97.5
gangræna brachij 303. penult.
gangrænę pudendi curatio. 101.
16
ex Gaudij magnitudine mors
37. 10
gingipedijs morbus 10.10
gingiuarum putredinis curatio
25. 16
glandis frenum 98.3
glandis masculę clausę curatio
105. 24
glycyrrhiza *αλφλ* 75.19
gratiolæ herbæ usus in hydro-
pe 65.24
Guidonis de Cauliaco locus
55.9
Guil. Vatignanę de tela aranę
traditio 43.23
halecum semicostorum magna
copia deuorata, quartana cu-
rata 46.2
Henricus Vuierus philosophiæ
& medicinę doctor, Ioannis
F. 64 antepenult. eiusdę pal-
pitatio cardiaca ex assiduis
studiorum laboribus contra-
cta. ibid.
Henricum Hassen xxxiii an-
nis quartana laborasse 36.26
herba de sancti Barbe 36.13
Herteueldia matrona etiam se-
nex, quartana laborans con-
uulsa

INDEX.

uauit	39.11	lauri baccharum electuarium.	
Hippocratis locus	10.20. & 11.2.		73.10
& 27.18. & 80.4. & 81.21		Leonidis, de aquæ in hydro-	
Hippocratis præceptum in an-		pis curatione educendę ratio	
gina pestilentiali negligendu	52.21	ne sententia	81.2
hirundinarię radidis decoctum	76.5	leucophlegmatix à cerebri flu-	
hydrops mulieris utero ex casu		xione ortæ curatio	81.20
eliso curatus	81.13	lienes magnos qui morbi comi-	
hydropis curatio	65.6. inde	tentur	10.25. & 11.1
in Hydropis curatione duo præ-		lixiuum à iuniperi cineribus	
cipue obseruanda	75.9	71.19 item sarmentorum ac	
qualis uictus ratio cõueniat.		genistæ	ibid.
81.17		lotium, sanguinis serum	29.2
pro Hydropis diuersa specie, di-		lumbicis in Anasarca pellen-	
uersam etiam medendi ratio-		dis medicamen.	71.9
nem requiri	65.18		M
hydropis ex splenis consensu		Maceris oleum	74.1
orti curatio	72.24	Marini de Caballis palpitatio-	
hyemis sæuitia Anni	15.65.	ne cardiaca laborantis histo-	
hymen uirginitatis custos, eoq;		ria	64.3
omne puellarum genus ab-		matricis colli phyma, eiusq; cu-	
initio dotatum esse	95.25.	ratio	100.24. inde
&	99.21	mezereon	70.17. de Mezereo
in Hypofarca extrahendę e pe-		oleum. ibid.	26
de & supra talem aquę ratio.		mollificatio putredinis parens	
80.14		& austrix	87.9
ignis frigidus	105.1	morbinoui & prodigiosi, ex no-	
ignis S. Antonij	104.30	uis & enormib. flagitijs na-	
indis radicum succus	66.14.	sci soliti	3.18
&	69.17	morborum parens, flagitiorum	
ex Iride conditum	69.25	frequentia	3.8
iuniperini olei uirtus	71.18.	morborum reliquias, recidiuas	
item lixiuij.	ibid. 19	facere	37.6
		morbis nouis Deū pro sua cle-	
		mentia subinde noua etiam	
		remedia suppeditare	3.24
		&	4.10
		morbos extremos, extrema	
		p quoq;	

INDEX

quoque remedia postulare	79.8	pestis subito & uehementiori hyemis frigore repressa	53.
mors unde	63.14	18. inde	
à Morual Comes quartanarius gaudio mortuus	37.7	pestis grassatio anni 1565. ferme uniuersalis	50.1. inde
Mosis locus explicatus	99.19	contra pestem antidotum	59.
inde		20.	
mutationis omnis proprietas in unius prædominio	63.11	petrolei usus	71.23
mutationes temporū perere ægritudines	49.20	prurigo	3. ult.
N		phlebotomiæ obstacula	56.8
Nabatæi scorbuto correpti, Augusti Cesaris	8. ult.	phrenitidis causa	51.15
nasturtium aquaticum minus	35.12	Petrus Bayrus	44.26
ibid. 21. hybernium. ibid. 28.		pleuritis pestilens	51.19
nasturtium hyemale	18.4	stilentialis	54.1
nasturtij species tres in scorbuti curatione utiles	36.14	pleuritidis curatio	55.26
Neapolitana labes ex immoderato ueneris usu	84. ult.	Plinij locus	7.28. inde
Nigrorum, uirginalia puellarū consuendi mos	99.4	portulacæ folia	33.22
nucum olei usus	74.1	prædicendi cautio qualis à Medicis obseruanda	62.24. inde
O		proceritas iuuenis cuiusdam prodigiosa	43.19
Olai Magni locus	12.4.23	in Prognosticando, duo à Medicis obseruanda	63.4
oleum iuniperinum	71.18	vide de Synop. Dioscoridis	36.10
oscedo	10.8	pudendi clausi curatio	87.12
P		pudendi gangrenæ curatio.	101.
Palpitatio cardiaca	64.2	16.	
Paracelsi linimentum, ad uteros contrahendum	100.17	pulsus intermittens, caprizans	59.8. & 60. antepenult. & 62.
Paracelsistæ iactabundi	38.6	19.	
passularum esus ad sitim restinguendam	75.18	pulsus intermittens quatenus non arguat imminens mortis periculum	63.22. & 64.5
pectorales potiones	57.1	pulsus intermittens prælagium	58.19 inde
peripneumonia pestilens	51.21	pulsus continuatio aut defectio quid significet	63.15
		pulueris lenæ solutiui usus & descriptio	

INDEX

descriptio [61. ult. & 62. 1](#) recidiuæ morborū ex reliquijs

Q
 Quartæ pondus [22. 17](#) roborantia medicamenta in hy
 quartana an quisquā bis labo- [37. 6](#)
 rare possit [38. 9. & 41. penult.](#) drope [72. 8](#)
 quartana quatenus interficere de Role dominus Maximiliani
 hominem possit [39. 24](#) Imp. æconomus, quartana
 quartana quinquennio & sep- mortuus [37. 12](#)
 tennio mortui [37. 17](#) Rolmanni Biládij gangræna cu
 quartanæ generatio non præ- rata [103. 4](#)
 cept [41. 18](#) Rutgeri à Randuwick febricien
 quartanæ paucarum septima- tis historia [58. 21](#)

S
 quartanæ paucarum septima-
 narum spacio abigendæ rati-
 tio [38. 2](#) Sambuci uirtus [67. 5. & 69. ult.](#)
 quartanæ profligandæ an telæ sanguinis minutio in febrib. pe
 aranæ usus aliquis [43. 23](#) silentibus periculosa [59. 14](#)
 quartanæ prolongatio unde sanguinis profluuium inhi-
 causetur [37. 20](#) bens puluis [91. 13](#)
 quartanæ remedia [46. 10. inde](#) sanguinē menstruū retentū in
 quartanæ repetitio difficilior uirgine gigætea, ad nutritio-
 cur [38. 23](#) nem & corporis molem pro-
 quartanæ superstitiosa curatio mouisse [40. ult. & 42. 5. inde](#)
 ex aranea collo appensa [45. 1](#) sarcocole [85. 8](#)
 quartanam bis hominem corri- [sceletrbe. 7. 28. & 8. 7. penult. & 9. 17. & 10. 5. penult. & 11. 17.](#)
 pere [38. 12](#) scorbutum [9. ult.](#)
 quartanam senes non semper scorbein [7. 24.](#)
 enecare [39. 5](#) scorbus [7. 20 & 12. 14.](#)
 quartanam triginta tribus an- scorbutus ab Olao Magno de-
 nis durare posse [36. 28](#) scriptus [12. 7](#)
 quartanarij curà conualescen- scorbutus an Istericia nigra,
 tia uoraciores [42. 14. 19](#) uoluuli species, hæmate,
 quartanarios, ubi conualuere, &c. [12. 7](#)
 magis increfcere [42.](#) scorbutus quid [7. 5](#)
 ult. scorbuti causæ [13. 8. signa. 14. 5](#)

R
 Rapi rotundi succus [76. 1](#) prognostica [16. 31](#)
 recidiua ex nimia ingluuie à cō scorbuti curatio [18. 10](#)
 ualescentia [42. 16](#) mum grassetur [8. 12. inde](#)

p a scorbu.

I N D E X.


scorbuti lues uetus, sed pecu-	stomacace	7.28. & 8.6.
rib. tantum locis familiaris.	<i>gouanena.</i>	9.17
4.18	stomachalia scuta	74.5
scorbuti morbus an etiam uete	Strabonis ætas	9.10
ribus medicis cognitus. 10.12	strangulatus, atrocissimū mor	
inde	ris genus	51.9
scorbuto laborantibus qualis	sudor in hydropē curando mo-	
uictus ratio tenenda 17.5	uendus	75.26
scormunt 7.22	sudorem excitātia. ibid. penult.	
scroti in hydropē aperiendi ra-	inde. &	78.11
tio 81.4.8	sudoriferum decoctum	77.21
senium certæ anni proprietati	T	
non semper assignari posse.	Taurini stercoreis uis	23. 11.
40.4	&	22.23
serum ex nigrarum caprarum	tele araneæ noxiæ assumptio in	
lacte, item ouillo, cæteris præ	quartana. 43.23. uide Aranea	
stantius 29.17	telephium an cochlearia 33.3 in	
serum lactis. 28.25 sanguinis. 29.	quibus differat	34. inde
2. ueriusq; uires. ibid. inde	telephij folia	33.25
senæ solutiu pulueris compo-	testiculi sinistri carcinomatis cu	
sitio & usus 61. ult. & 62.1	ratio.	84.6
sideratio 104.29	thermarū usus in hydropē	78.7
sysebro aquatico 35.24	thymeleæ uinum	70.9
sylibrium cardamine 35.11	tibiarum exulceratio	27.1
sitis toleranda in hydropis cu-	tibiarum tumores discutientia.	
ratione 75.11	79.5	
siti restinguendę conducentia.	tubuli forma	94
75.19	tumorum in crurib. forus	26.19
Sorani de hymene sententia.	tympanitis curatio 71.2. & 73.9.	
97.19	&	74.19
specilli forma.	94	
speculi incurui forma. ibid.	Valescus de Taranta	55.17
sphacelos 104.27 extremi	uenę sectio in pleuritide pesti-	
pedis 105.9	lente noxiæ	55. penult.
splenes magnos qui morbi co-	uentriculo applicāda in hydro-	
mitentur 10.25 & 11.1	pe	74.3
Steinsuvert insula 36.27	uentris musculorum abscessus	
stibij usus 67.24	47. antepenult.	
	ueronicæ uinum	76.9
	uelicæ	

I N D E X

uesicę colli extremitatem non	ne roborandorū ratio.	<u>79.26</u>
eodem loco apparere in cun-	uitis syluestris radix	<u>67.23</u>
ctis feminis	uitrioli oleum	<u>68.1</u>
Victor Trincauella medicus Pa-	umbilici in Ascite aperiendi, &	
tauinus	aquę inde educendę ratio.	
uini sublimati usus in hypofar-		<u>79.12</u>
ca	<i>ſcndę</i>	<u>97.11</u>
uirginalia indicia, quorū Moy-	urinarij meatus masculi clauſi	
les meminit	curatio.	<u>105.24</u>
uirginitatis zona	uteri ceruicis incidendi modus	
nale clauſtrum		<u>88.3. & 89.7. inde</u>
uirgo gigātea ex quartanę mor-	uteri clauſi curatio	<u>87.11. inde</u>
bo reddita	uteri colli gangræna	<u>101.16</u>
uirginum pudenda conſuendi	ad Vteri incisionē, eiꝯq; cura-	
mos apud Nigros	tionem, non quiuis temerē	
uirtus coacta fortior quā di-	admittendus	<u>93.6</u>
ſperſa	utero ex caſu eliſo, hydrops cu-	
uiſcera roborantia medicamen-	ratus	<u>81.13</u>
ta in Ascite & Anafarca	Waſſerkreſſen	<u>35.26</u>
uiſcerum in hydropis curatio -	Wꝯterkreſſ.	<u>36.13</u>

F I N I S.

P 3



BASILEAE, EX OFFICINA IOAN-
nis Oporini, Anno Salutis humanæ M. D.
LXVII. Mense Martio.

